

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Ультравита для лечения и профилактики гиповитаминозов
у сельскохозяйственных животных.

(организация-разработчик: фирма «Interchemie werken «De Adelaar» B.V.»,
Metaalweg 8, 5804 CG Venray, Netherlands)

I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата: Ультравит (Ultravit).

Международное непатентованное наименование: витамины, аминокислоты.

2. Лекарственная форма: раствор для инъекций.

Ультравит в качестве действующих веществ в 1 мл содержит: ретинол-пальмитат (витамин А) – 15000 МЕ; холекальциферол (витамин D₃) – 7500 МЕ; α-токоферол ацетат (витамин Е) – 20 мг; тиамин гидрохлорид (витамин B₁) – 10 мг; рибофлавин натрий фосфат (витамин B₂) – 5,0 мг; пиридоксин гидрохлорид (витамин B₆) – 3,0 мг; цианокобаламин (витамин B₁₂) – 60 мкг; D-пантенол – 25 мг; никотинамид – 50 мг; фолиевую кислоту – 150 мкг; биотин – 125 мкг; холин хлорид – 12,5 мг; лизин гидрохлорид – 7,0 мг; DL – метионин – 5,0 мг, а также вспомогательные компоненты: бензиловый спирт – 0,02 мл, макрогольглицерол рицинолеат – 137,5 мг, натрия гидроксид – до pH 4,5 и воду для инъекций – до 1 мл.

3. По внешнему виду представляет собой жидкость коричневого цвета.

Срок годности Ультравита при соблюдении условий хранения – 2 года с даты производства.

После вскрытия упаковки хранить при температуре от 2 °C до 8 °C в течение 14 суток.

Лекарственный препарат запрещается применять по истечении срока годности.

4. Лекарственный препарат выпускают расфасованным по 100 мл в стеклянные флаконы соответствующей вместимости, укупоренные резиновыми пробками и укрепленные алюминиевыми колпачками. Каждый флакон помещают в индивидуальную картонную пачку и снабжают инструкцией по применению.

5. Ультравит хранят в закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от 5°C до 25°C.

6. Ультравит следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат с истёкшим сроком годности утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Фармакотерапевтическая группа: витамины в комбинации с аминокислотами.

10. Ультравит, благодаря наличию сбалансированного количества витаминов и аминокислот, компенсирует дефицит этих биологически активных веществ в организме животных, возникающий при стрессах, после перенесенных заболеваний, профилактических прививок и дегельминтизации, способствует нормализации обмена веществ при несбалансированном кормлении, положительно воздействует на репродуктивную функцию, рост, развитие и продуктивность животных.

Ультравит по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности), не обладает эмбриотоксическими, тератогенными и гепатотоксическими свойствами.

III. Порядок применения.

11. Ультравит назначают для лечения и профилактики недостатка витаминов и аминокислот у сельскохозяйственных животных.

12. Противопоказаний для применения не установлено.

13. Ультравит применяют подкожно или внутримышечно, однократно, в следующих дозах (мл/на голову):

- взрослое поголовье крупного рогатого скота и лошадей: 10,0 – 15,0;
- телята, жеребята, овцы и козы: 5,0 – 10,0;
- ягнята: 5,0 – 8,0;
- свиньи: 2,0 – 10,0.

По показаниям через 7-10 дней проводится повторная инъекция в вышеуказанных дозах.

В одно место инъекции не рекомендуется вводить более 10 мл взрослому поголовью крупного рогатого скота и лошадям и более 5 мл телятам, жеребятам, овцам, козам, ягнятам и свиньям.

14. Симптомы передозировки препарата не выявлены.

15. Особеностей действия при начале применения Ультравита и при его отмене не выявлено.

16. Применяется для беременных животных, животным в период лактации, а также для потомства животных.

17. Ультравит применяется однократно.

18. При применении Ультравита в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, не наблюдается.

19. Возможно применение одновременно с другими лекарственными средствами.

20. Продукцию животноводства после применения Ультравита используют в пищевых целях без ограничений.

IV. Меры личной профилактики

21. При работе с Ультравитом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

22. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаза, их необходимо промыть большим количеством воды.

23. Пустую тару из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения

«Interchemie werken «De Adelaar» B.V.»
Metaalweg 8, 5804 CG Venray,
The Netherlands

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя

«Interchemie werken «De Adelaar» B.V.»
Metaalweg 8, 5804 CG Venray,
The Netherlands.

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Ультравита, утвержденная Россельхознадзором 04 февраля 2015 года.

Номер регистрационного удостоверения 528-3-14.14-2498 №ПВИ-3-11.9/03024