

СОГЛАСОВАНО  
Заместитель Руководителя  
Россельхознадзора



И.А. ВЛАСОВ

19.10.2017

## ИНСТРУКЦИЯ

по применению вакцины Дефенсор-3 для профилактики бешенства у крупного рогатого скота, овец, собак, кошек и хорьков инактивированной

(Организация-разработчик компания «Zoetis Inc», 10 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054, USA)

### I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Дефенсор-3 (Defensor-3).

Международное непатентованное наименование: вакцина для профилактики бешенства у крупного рогатого скота, овец, собак, кошек и хорьков инактивированная.

2. Лекарственная форма: суспензия для инъекций. Вакцина изготовлена из инактивированного бета-пропиолактоном вируса бешенства (штамм PV – Paris), с добавлением адъюванта – гидроксида алюминия, и консервантов: гентамицина и мертиолята.

3. По внешнему виду вакцина представляет собой прозрачную или слегка опалесцирующую жидкость розового цвета.

Срок годности вакцины 18 месяцев с даты выпуска при соблюдении условий хранения и транспортирования. По истечении срока годности вакцина к применению не пригодна. После вскрытия флакона вакцину следует использовать в течение 6 часов.

4. Вакцина расфасована по 1, 10, 25 и 50 мл (1, 10, 25 и 50 доз для собак, кошек, хорьков и 0.5, 5, 12.5 и 25 доз для крупного рогатого скота и овец соответственно) в пластиковые флаконы соответствующей вместимости. Флаконы герметично закупорены резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками. Флаконы герметично закупорены резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками. Флаконы с вакциной по 1 мл упакованы в пластиковые коробки по 50 флаконов. Флаконы с вакциной по 10 мл упакованы по 5 флаконов в картонную коробку.

Вторичная упаковка не предусмотрена для презентаций 25 и 50 мл. В каждую коробку с вакциной по 1 и 10 мл вкладывают инструкцию по применению на русском языке. К каждому флакону по 25 и 50 доз инструкцию на русском языке прикладывают отдельно.

5. Вакцину хранят и транспортируют в заводской упаковке при температуре от 2°C до 7°C. Не допускается замораживание вакцины.

6. Вакцину следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Флаконы с вакциной без этикеток, с нарушением целостности и герметичности укупорки, содержащие постороннюю примесь, с измененным цветом и консистенцией, с истекшим сроком годности, подвергавшиеся замораживанию, а также остатки вакцины, не использованные в течение 6 часов после вскрытия флакона, выбраковывают и обеззараживают кипячением в течение 15 минут с последующей утилизацией.

Утилизация обеззараженной вакцины специальными мер предосторожности не требует.

8. Условия отпуска: отпускается без рецепта ветеринарного врача.

## II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

9. Фармакотерапевтическая группа: иммунобиологический лекарственный препарат.

10. Вакцина индуцирует формирование иммунного ответа у крупного рогатого скота, овец, собак, кошек и хорьков к бешенству через 21 день после однократного применения, который сохраняется не менее 1 года.

Вакцина безвредна, лечебными свойствами не обладает.

## III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

11. Вакцину Дефенсор-3 применяют для иммунизации крупного рогатого скота, овец, собак, кошек и хорьков против бешенства, начиная с 3 месячного возраста.

12. Запрещено вакцинировать клинически больных, ослабленных, подозрительных по заболеванию бешенством животных, в случае индивидуальной повышенной чувствительности животного к компонентам препарата.

13. Для вакцинации используют шприцы и иглы, которые стерилизуют кипячением в течение 15-20 минут. Допускается использование одноразовых шприцов. Стерилизация шприцов и игл химическими средствами не допускается. Место инъекции обрабатывают 70% спиртом или другим дезинфицирующим раствором.

Перед применением флакон с вакциной необходимо тщательно встряхнуть до образования гомогенной суспензии.

### **Вакцинация собак, кошек и хорьков:**

Вакцину вводят в дозе 1 мл с соблюдением правил асептики. Кошкам и хорькам вакцину вводят подкожно, собакам подкожно или внутримышечно. Повторная вакцинация должна быть проведена через 1 год. В дальнейшем, в неблагополучных по бешенству районах ревакцинация осуществляется 1 раз в год, в благополучных допускается вакцинировать животных 1 раз в 3 года.

### **Вакцинация крупного рогатого скота и овец:**

Вакцину вводят внутримышечно в дозе 2 мл с соблюдением правил асептики. Повторная вакцинация должна быть проведена через 1 год. В дальнейшем, ревакцинация осуществляется 1 раз в год.

14. Симптомов проявления бешенства или других патологических признаков при передозировке вакцины не установлено.

15. Особенности поствакцинальной реакции при первом и последующих введениях не установлено.

16. Вакцинацию беременных и лактирующих самок следует проводить при необходимости после консультации с ветеринарным врачом.

17. Следует избегать нарушений сроков введения вакцины, поскольку это может привести к снижению эффективности иммунопрофилактики бешенства. В случае пропуска очередного введения вакцины необходимо провести иммунизацию как можно скорее. Далее интервал до следующего введения препарата не изменяется.

18. При применении вакцины в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не отмечается.

В редких случаях вакцина может вызвать аллергическую реакцию. В данном случае использование препарата прекращают и назначают антигистаминные средства, адреналин, кортикостероиды или другое симптоматическое лечение.

19. Взаимодействие с другими лекарственными препаратами не установлено.

20. Убой животных на мясо производят не ранее, чем через 21 день после вакцинации.

## **IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ**

21. При работе с вакциной следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами ветеринарного назначения.

22. Все лица, участвующие в проведении вакцинации должны быть в спецодежде (резиновые сапоги, халат, брюки, головной убор, перчатки). В местах работы должна быть аптечка доврачебной помощи.

23. При попадании вакцины на кожу и/или слизистые оболочки необходимо промыть их большим количеством водопроводной воды. После работы с вакциной вымыть руки с мылом.

При случайной инъекции препарата человеку необходимо обратиться в медицинское учреждение.

Наименования и адреса  
производственных площадок  
производителя лекарственного  
препарата для ветеринарного  
применения

Зоэтис Эл Эл Си, 601 Уэст  
Корнхаскер Хайуэй, Линкольн,  
Небраска 68521, США / Zoetis LLC  
601 W. Cornhusker Highway, Lincoln,  
NE, 68521, USA .

Наименование, адрес организации,  
уполномоченной держателем или  
владельцем регистрационного  
удостоверения лекарственного  
препарата на принятие претензий от  
потребителя

ООО «Зоэтис» в РФ: 123112,  
Москва, Пресненская набережная, д.  
10.

Номер регистрационного удостоверения: *840-Р-13.17-3911 N1784-Р-4.9/00192*

С утверждением настоящей Инструкции утрачивает силу  
Инструкция по применению вакцины Дефенсор 3, утвержденная  
Россельхознадзором 26 августа 2014 года.