

СОГЛАСОВАНО  
Заместитель Руководителя  
Россельхознадзора

ЛАСОВ

9. 02. 2016

## ИНСТРУКЦИЯ

по применению препарата Прак-тик<sup>®</sup> для борьбы с эктопаразитами собак

(Организация-разработчик: «Elanco Europe Ltd.»; Lilly House, Priestley Road, Basingstoke, Hampshire, RG24 9NL, UK / «Эланко Юроп Лтд.»; Лилли Хаус, Пристли Роуд, г. Бейсингсток, графство Гэмпшир, RG24 9NL, Великобритания)

### I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Прак-тик<sup>®</sup> (Prac-tic<sup>®</sup>).  
Международное непатентованное наименование: пирипрол.
2. Лекарственная форма: раствор для наружного применения.  
Прак-тик<sup>®</sup> содержит в качестве действующего вещества пирипрол – 12,5%, а также вспомогательные вещества – бутилгидрокситолуол и диэтилглицольмоноэтиловый эфир.
3. По внешнему виду препарат представляет собой бесцветный или желтого цвета раствор.  
Срок годности препарата при соблюдении условий хранения – 5 лет со дня производства.  
Запрещается применение препарата по истечении срока годности.
4. Выпускают Прак-тик<sup>®</sup> расфасованным по 0,45; 1,1; 2,2 и 5,0 мл в полипропиленовые пипетки, упакованные по 3 штуки в блистеры из алюминиевой фольги, помещенные в картонные коробки вместе с инструкцией по применению.
5. Хранят Прак-тик<sup>®</sup> в закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от света месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 2<sup>0</sup>С до 25<sup>0</sup>С.
6. Прак-тик<sup>®</sup> следует хранить в недоступном для детей месте.
7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.
8. Условия отпуска: отпускается без рецепта ветеринарного врача.

### II. Фармакологические свойства

9. Прак-тик<sup>®</sup> относится к инсектоакарицидным лекарственным препаратам группы фенилпирозола.

10. Пирипрол, входящий в состав препарата, обладает выраженным инсектицидным и акарицидным действием в отношении имагинальных и преимагинальных фаз развития паразитирующих на собаках насекомых, включая блох (*Ctenocephalides canis*), вшей (*Linognathus setotus*) и власоедов (*Trichodectes canis*), а также иксодовых клещей – *Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*, *Dermacentor reticulatus*, *Ixodes scapularis*, *Dermacentor variabilis*, *Amblyomma americanum*.

Механизм действия пирипрола основан на взаимодействии с каналами хлора, включая зависимые от нейромедиатора гамма-аминомасляной кислоты (ГАВА), что блокирует пре- и постсинаптический перенос ионов хлора через мембраны клеток. Это приводит к нарушению передачи нервных импульсов, вызывая гибель насекомых и иксодовых клещей.

После капельного нанесения препарата на кожу пирипрол, практически не всасываясь в системный кровоток, постепенно распределяется по поверхности тела, оказывая контактное инсектоакарицидное действие.

Прак-тик<sup>®</sup> по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), не обладает кожно-раздражающими и резорбтивно-токсическими свойствами; в рекомендуемых дозах не оказывает эмбриотоксического и тератогенного действия. Хорошо переносится собаками разных пород и возраста. Препарат токсичен для пчел, а также рыб и других гидробионтов.

### III. Порядок применения

11. Прак-тик<sup>®</sup> применяют с целью уничтожения блох, вшей, власоедов и иксодовых клещей, паразитирующих на собаках, а также для защиты животных от их нападения.

12. Противопоказанием к применению препарата является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата, в том числе в анамнезе. Не разрешается применять Прак-тик<sup>®</sup> больным инфекционными болезнями и выздоравливающим животным, собакам массой менее 2 кг и щенкам до 8-недельного возраста.

13. Препарат применяют путем капельного («spot-on») нанесения на сухую неповрежденную кожу животного.

Для уничтожения блох и клещей обработку собак проводят однократно, для предупреждения повторной инфекации на протяжении всего сезона активности паразитов – по показаниям, но не чаще одного раза в месяц.

При терапии аллергического дерматита, вызванного насекомыми, препарат целесообразно использовать в сочетании с лекарственными препаратами патогенетической и симптоматической терапии.

Перед использованием у пипетки отламывают кончик, затем, раздвинув шерсть и, нажимая на пипетку, препарат наносят животному непосредственно на кожу в места, недоступные для слизывания – между лопатками у основания шеи. При обработке крупных животных содержимое пипеток наносят на кожу в 2–3 точки вдоль линии спины.

Минимальная терапевтическая доза препарата Прак-тик<sup>®</sup> составляет 0,1 мл на 1 кг массы животного, что эквивалентно 12,5 мг пирипрола на 1 кг массы животного.

В зависимости от массы собаки используют Прак-тик<sup>®</sup> различной фасовки в дозах, указанных в таблице:

Масса животного	Доза на животное – номинальный объем пипетки, мл	Доза пирипрола, мг/кг массы животного
от 2,0 кг до 4,5 кг	0,45	12,5 – 28,1
от 4,5 кг до 11 кг	1,1	12,5 – 30,6
от 11 кг до 22 кг	2,2	12,5 – 25,0
от 22 кг до 50 кг	5,0	12,5 – 28,4
более 50 кг	комбинация пипеток*	

\* При обработке собак массой более 50 кг Прак-тик<sup>®</sup> применяют в дозе 0,1 мл на каждый кг массы животного, используя комбинацию пипеток различной фасовки.

Не следует наносить препарат на влажную или поврежденную кожу, мыть животное с моющим средством в течение 48 часов перед обработкой, а также купать в водоемах в течение 24 часов после обработки препаратом.

14. При передозировке у животного могут отмечаться неврологические симптомы: ухудшение координации движений, тремор, одышка, гиперсаливация (при слизывании препарата), которые самопроизвольно исчезают в течение нескольких часов и не требуют применения лекарственных средств.

15. Особенности действия препарата при его первом применении и отмене не выявлено.

16. Обработку щенных и кормящих сук при необходимости следует проводить под наблюдением ветеринарного врача.

Не допускается применение Прак-тика<sup>®</sup> щенкам моложе 8-недельного возраста

17. В случае пропуска очередной профилактической обработки животного в сезон активности эктопаразитов ее следует провести как можно скорее в той же дозе.

18. При применении Прак-тика<sup>®</sup> в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений у животных, как правило, не наблюдается. В редких случаях после применения препарата у некоторых животных наблюдаются индивидуальные реакции кожи (покраснение, зуд), которые самопроизвольно проходят в течение 1–4 дней и не требуют применения лекарственных средств.

19. Прак-тик<sup>®</sup> не разрешается применять одновременно с другими инсектоакарицидными препаратами для обработки животных.

20. Прак-тик<sup>®</sup> не предназначен для обработки продуктивных животных.

#### IV. Меры личной профилактики

21. При применении Прак-тика<sup>®</sup> следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. После работы с препаратом следует тщательно вымыть руки теплой водой с мылом.

22. Не следует гладить места нанесения препарата и подпускать животное к маленьким детям в течение 24 часов после обработки Прак-тиком<sup>®</sup>. Запрещается использование пустых пипеток из-под препарата для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами

23. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз их необходимо промыть большим количеством проточной воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Прак-тиком<sup>®</sup>.

В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Наименования	и	адреса	Организация,	осуществляющая
производственных		площадок	производство :	
производителя лекарственного		препарата	«Dottikon Exclusive Synthesis AG»;	
для ветеринарного применения.			Hembrunnstrasse 17, CH-5605 Dottikon,	

Switzerland / «Доттикон Эксклюзив Синтезис АГ»; Хембруннштрассе 17, СН-5605 Доттикон, Швейцария.

Организация, осуществляющая фасовку, упаковку, контроль качества и выпуск продукции:

«Klocke Verpackungs-Service GmbH»; Max Becker Strasse 6, D-76356 Weingarten, Germany / «Клокке Ферпаккунгс-Зерфице ГмбХ»; Макс Беккер Штрассе 6, D-76356 Веингартен, Германия.

Наименование, адрес уполномоченной регистрационной лекарственного препарата на претензий от потребителя.	адрес организации, владельцем удостоверения	ООО «Эланко Рус»; 123317, Россия, г. Москва, Пресненская набережная, 10.
--	---	--

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Прак-тика<sup>®</sup> для борьбы с эктопаразитами собак, утвержденная Россельхознадзором 20 мая 2014 года.

Номер регистрационного удостоверения 705-3-4.14-3049 N ПРЧ-3-38102666