

## ИНСТРУКЦИЯ

по применению кормовой добавки ЛАКТОБИФАДОЛ ФОРТЕ для восстановления и поддержания нормальной микрофлоры кишечника, повышения сохранности и продуктивности животных

(Организация-производитель: ООО БФ «Компонент», г. Бугуруслан, Оренбургской области)

### I. Общие сведения

1. Название кормовой добавки: ЛАКТОБИФАДОЛ ФОРТЕ (LACTOBIFADOL FORTE).
2. Состав: содержит высушенную сорбционным методом микробную массу молочнокислых бактерий *Lactobacillus acidophilus* ЛГ1-ДЕП-ВГНКИ в количестве не менее  $1,0 \times 10^6$  КОЕ/г, бифидобактерий *Bifidobacterium adolescentis* В-1-ДЕП-ВГНКИ в количестве не менее  $8,0 \times 10^7$  КОЕ/г и наполнитель – отруби пшеничные или муку пшеничную, или мальтодекстрины.
3. По внешнему виду ЛАКТОБИФАДОЛ ФОРТЕ представляет собой однородный сыпучий порошок от белого до бежево-коричневого цвета.  
Не содержит генно-инженерно-модифицированных компонентов.  
Содержание вредных примесей не превышает предельно допустимых норм, действующих на территории Российской Федерации.
4. ЛАКТОБИФАДОЛ ФОРТЕ выпускают расфасованным по 40, 50, 500, 1000, 2000, 10000 г в герметично запаянные полиэтиленовые пакеты.  
Каждую единицу фасовки маркируют на русском языке с указанием: организации производителя, ее адреса и товарного знака, названия, назначения, способа применения, массы нетто, состава и гарантированных показателей, номера партии, даты изготовления, срока и условий хранения, информации о соответствии, номера государственной регистрации, надписи «Для животных» и снабжают инструкцией по применению.

ЛАКТОБИФАДОЛ ФОРТЕ хранят в упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, 18 месяцев с даты выпуска при температуре от 2 до 10°C, 12 месяцев с даты выпуска при температуре от 10 до 20°C.

По истечении срока годности ЛАКТОБИФАДОЛ ФОРТЕ к применению не пригоден.

### II. Биологические свойства

5. Эффект от применения добавки обеспечивается за счет восстановления и поддержания в кишечнике животных высокого популяционного уровня ацидофильных и бифидобактерий. Размножаясь, эти бактерии выделяют молочную кислоту и другие биологически активные субстанции, которые сдерживают развитие патогенной и условно-патогенной микрофлоры, в том числе эшерихий, протей, сальмонелл, стафилококков, активизируют обмен веществ, в результате чего повышается сохранность и продуктивность поголовья.

### III. Порядок применения

6. ЛАКТОБИФАДОЛ ФОРТЕ применяют для восстановления и поддержания нормальной микрофлоры кишечника, повышения сохранности и продуктивности животных.

7. ЛАКТОБИФАДОЛ ФОРТЕ применяют индивидуальным или групповым методом, смешивая его с кормом или выпаивая с молоком, заменителем цельного молока, молозивом, питьевой водой.

Рекомендуемые нормы ввода в корма и кормосмеси:

- молодняку крупного рогатого скота, жеребятam в возрасте 1-6 месяцев по 12 г на голову в сутки в смеси с концентрированными кормами ежедневно;
- взрослому крупному рогатому скоту на откорме, лактирующим коровам, лошадям по 25г на голову в сутки в смеси с концентрированными кормами ежедневно;
- свиноматкам супоросным по 5 кг на 1 т корма ежедневно;
- свиноматкам лактирующим по 4 кг на 1 т корма ежедневно;
- пороссятам в период дорастивания (живой массой 10-35 кг) по 2 кг на 1 т корма ежедневно;
- подсвинкам живой массой 35-70 кг по 2,5 кг на 1 т корма ежедневно;
- свиньям на откорме живой массой 70 кг и более по 3 кг на 1 т корма ежедневно;
- пушным зверям, кошкам, собакам по 0,1 г/кг массы животного в сутки один раз в день ежедневно;
- бройлерным цыплятам по 1 кг на 1 т комбикорма ежедневно в течение 20-30 дней или с питьевой водой по 0,3-0,4 г на голову в сутки;
- молодкам и взрослым курам-несушкам по 1,5 кг на 1 т комбикорма ежедневно в течение 20-30 дней или с питьевой водой по 0,3-0,4 г на голову в сутки.

Корма и кормосмеси с добавкой термической обработке подвергать запрещается.

8. При применении добавки в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений не отмечается.

9. В период применения добавки пероральное введение антибиотиков и других химиотерапевтических веществ не рекомендуется. Внутримышечное применение антимикробных препаратов при наличии показаний не ограничивается.

10. Противопоказаний для применения не выявлено.

11. Продукцию животноводства после применения ЛАКТОБИФАДОЛА ФОРТЕ реализуют без ограничений.

### IV. Меры личной профилактики

12. При применении добавки ЛАКТОБИФАДОЛ ФОРТЕ следует соблюдать правила личной гигиены. Запрещается пить, курить и принимать пищу. После работы следует вымыть руки с мылом.

13. При попадании добавки на кожу и/или слизистые оболочки рекомендуется промыть их большим количеством водопроводной воды.

Инструкция разработана: ООО БФ «Компонент», 461631, г. Бугуруслан Оренбургской области, ул. Пилюгинское шоссе, д. 51.

Организация-производитель: ООО БФ «Компонент», 461631, г. Бугуруслан Оренбургской области, ул. Пилюгинское шоссе, д. 51.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

Регистрационный номер ПВР-2-4.17/03338