

19.02.2026

## ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата

Бимаксгард® ПЛЮС

(Организация-разработчик: АО «НПФ «Экопром»; 140070, Московская обл., г. Люберцы, р. п. Томилино, ул. Гаршина, д. 11/23, пом. 263)

Номер регистрационного удостоверения: 32-3-02.25-5267№ПВР-3-02.25/04043

### I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:

торговое наименование: Бимаксгард® ПЛЮС (Bimaxguard® PLUS);

международные непатентованные наименования действующих веществ: имидаклоприд, перметрин.

2. Лекарственная форма: раствор для наружного применения.

Бимаксгард® ПЛЮС в 1 мл содержит действующие вещества: имидаклоприд – 100 мг, перметрин – 500 мг и вспомогательные вещества: N-метилпирролидон, миглиол 812, лимонная кислота и бутилгидрокситолуол.

3. Бимаксгард® ПЛЮС по внешнему виду представляет собой прозрачную жидкость желтого цвета.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 3 года с даты производства.

По истечении срока годности Бимаксгард® ПЛЮС не должен применяться.

4. Выпускают Бимаксгард® ПЛЮС расфасованный по 0,4; 1,0; 2,5; 4,0 и 6,0 мл в полимерные пипетки, упакованные поштучно в блистеры, помещенные в картонные пачки вместе с инструкцией по применению.

5. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 2°С до 25 °С.

6. Препарат следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

### II. Фармакологические свойства

9. Бимаксгард® ПЛЮС относится к фармакотерапевтической группе: инсектоакарицидные средства в комбинациях.

10. Имидаклоприд и перметрин, входящие в состав препарата, обладая синергидным эффектом, оказывают выраженное инсектицидное, акарицидное и репеллентное действие.

Бимаксгард® ПЛЮС эффективен против имагинальных, преимагинальных и личиночных фаз развития блох (*Ctenocephalides canis*, *Ctenocephalides felis*), власоедов (*Trichodectes canis*), иксодовых клещей (*Rhipicephalus sanguineus*, *Ixodes ricinus*, *Dermacentor reticulatus*), паразитирующих на собаках, обеспечивает защиту животных от нападения двукрылых кровососущих насекомых. Снижает риск возможной передачи животным трансмиссивных заболеваний, таких как: боррелиоз, риккетсиоз, лейшманиоз, а также возбудителя собачьего эрлихиоза (*Ehrlichia canis*) и др.

Механизм действия имидаклоприда основан на взаимодействии с ацетилхолиновыми рецепторами членистоногих и нарушении передачи нервных импульсов. Действуя как активатор нервного узла членистоногих, имидаклоприд усиливает также инсектоакарицидное действие перметрина.

Механизм действия перметрина заключается в блокировании передачи нервных импульсов, что вызывает нарушение координации движений, паралич и гибель эктопаразитов.

После применения препарата Бимаксгард® ПЛЮС его активные компоненты, практически не всасываясь в системный кровоток, быстро распределяются по поверхности тела и, удерживаясь на эпидермисе и шерсти, оказывают длительное (до 4-х недель) контактное инсектоакарицидное и репеллентное действие.

Бимаксгард® ПЛЮС по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), при нанесении на кожу в рекомендуемых дозах не оказывает местно-раздражающего, резорбтивно-токсического, эмбриотоксического, тератогенного, мутагенного и сенсibiliзирующего действия. Препарат токсичен для кошек, пчел, а также рыб и других гидробионтов.

### III. Порядок применения

11. Бимаксгард® ПЛЮС применяют для уничтожения насекомых и иксодовых клещей, паразитирующих на собаках, а также защиты животных от их нападения.

12. Противопоказанием к применению является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата.

Не разрешается применять Бимаксгард® ПЛЮС больным инфекционными болезнями и выздоравливающим животным, собакам массой менее 1,5 кг, а также животным других видов. При совместном содержании собак и кошек, учитывая плохую переносимость препарата кошками, для предотвращения случайного отравления (при слизывании), не следует допускать контакта кошки с обработанной собакой до полного высыхания мест нанесения препарата.

13. При работе с препаратом Бимаксгард® ПЛЮС следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами.

Во время работы с лекарственным препаратом Бимаксгард® ПЛЮС не разрешается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. Не следует гладить и подпускать животное к маленьким детям в течение 24 часов после обработки.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом Бимаксгард® ПЛЮС. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека, следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

14. Обработку беременных и кормящих сук проводят при необходимости по назначению и под контролем ветеринарного врача. Запрещается применение препарата щенкам моложе 7-недельного возраста и/или массой менее 1,5 кг.

15. Бимаксгард® ПЛЮС применяют наружно однократно путем точечного нанесения на кожу. Препарат извлекают из упаковки, кончик пипетки отламывают или отрезают ножницами, раздвинув шерсть, наносят препарат на сухую неповрежденную кожу в области шеи, у основания черепа или между лопатками. Не следует наносить препарат на влажную или поврежденную кожу и допускать его слизывания животным.

При обработке крупных животных содержимое пипеток наносят на кожу в 3-4 места вдоль спины, от холки до хвоста.

В зависимости от массы животного используют Бимаксгард® ПЛЮС различной фасовки в дозах, указанных в таблице:

Масса животного	Доза препарата (номинальный объем пипетки), мл	Доза действующих веществ, мг/кг массы животного	
		имидаклоприд	перметрин
до 4 кг	0,4	10	50
от 4 до 10 кг	1,0	10-25	50-125
от 10 до 25 кг	2,5	10-25	50-125
от 25 до 40 кг	4,0	10-16	50-80
от 40 до 60 кг	6,0	10-15	50-75

При обработке собак массой более 60 кг препарат применяют из расчета 0,1 мл/кг массы животного, используя комбинацию пипеток различной фасовки.

Гибель паразитирующих на животном насекомых после обработки происходит в течение 12 часов, гибель или открепление иксодовых клещей – в течение 48 часов. Репеллентное действие препарата против блох, власоедов, двукрылых кровососущих насекомых, а также иксодовых клещей после однократной обработки животного продолжается до 4 недель. Повторные обработки при необходимости проводят 1 раз в месяц.

При терапии аллергического дерматита, вызванного насекомыми, препарат целесообразно использовать в сочетании с лекарственными средствами патогенетической и симптоматической терапии.

Препарат остается эффективным, даже если шерсть животного намокнет, однако длительного нахождения животного в воде рекомендуется избегать, в целях предотвращения снижения эффективности обработки. В таких случаях животное может быть повторно обработано препаратом Бимаксгард® ПЛЮС, но не чаще 1 раза в неделю.

Если животное необходимо вымыть с шампунем, рекомендуется это сделать до нанесения препарата.

16. При применении лекарственного препарата Бимаксгард® ПЛЮС в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается. В редких случаях возможны индивидуальные реакции кожи (покраснение, зуд), которые самопроизвольно проходят в течение 1-4 дней и не требуют применения лекарственных средств. В случае проявления аллергических реакций у чувствительного к компонентам препарата животного, препарат следует тщательно смыть водой с мылом и ополоснуть шерсть большим количеством проточной воды, а при необходимости назначить антигистаминные и симптоматические средства.

17. При передозировке препарата у некоторых собак может наблюдаться угнетенное состояние, расширение зрачков, повышенное слюноотделение, мышечная дрожь. В этом случае препарат смывают водой с моющим средством и применяют общие меры, направленные на его выведение из организма.

18. Не следует применять лекарственный препарат Бимаксгард® ПЛЮС одновременно с другими противопаразитарными средствами, а также с препаратами, содержащими макроциклические лактоны.

19. Особенности действия препарата при его первом применении или при его отмене не установлено.

20. Следует избегать нарушений схемы применения препарата, так как это может привести к снижению его эффективности. В случае пропуска очередной обработки, применение препарата возобновляют, в той же дозе по той же схеме.

21. Препарат не предназначен для применения продуктивным животным.

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата	АО «Научно-производственная фирма «Экопром»; Московская обл., г.о. Люберцы, пгт. Томилино, ул. Гаршина, д. 11/23.
---------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Наименование и адрес организации, уполномоченной владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя	АО «Научно-производственная фирма «Экопром»; Московская обл., г.о. Люберцы, пгт. Томилино, ул. Гаршина, д. 11/23, пом. 263.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Генеральный директор  
АО «НПФ «Экопром»



В.В. Тарабрин