



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

Е.А.Непоклонов

31 АВГ 2012

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Галастопа для лечения ложной беременности и подавления лактации у сук

(организация-разработчик - компания «Ceva Sante Animale», Франция)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Галастоп (Galastop)

Международное непатентованное наименование: каберголин

2. Лекарственная форма: раствор для перорального применения.

В своем составе лекарственное средство в качестве действующего вещества содержит 50 мкг каберголина основания, а в качестве вспомогательного компонента очищенное кокосовое масло до 1 мл.

По внешнему виду Галастоп представляет собой прозрачную маслянистую жидкость от бесцветного до бледно-желтого цвета.

Галастоп выпускают расфасованным по 3, 7, 15 и 24 мл во флаконы из темного стекла с завинчивающейся крышкой и упаковывают в индивидуальные картонные коробки, в которые помещают инструкцию по применению препарата. Дополнительно каждый флакон снабжают стеклянной градуированной пипеткой в защитном футляре или дозирочным пластиковым шприцем.

3. Хранят Галастоп в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном от света месте при температуре от 5 °С до 25 °С.

4. Срок годности лекарственного средства при соблюдении условий хранения – 3 года с даты производства и 12 дней после вскрытия флакона. Запрещается использовать лекарственное средство после окончания срока его годности.

5. Галастоп следует хранить в недоступном для детей месте.

6. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. Фармакологические свойства

7. Фармакотерапевтическая группа лекарственного препарата: дофаминомиметики.

Каберголин, производное эрголина, обладает свойствами агониста дофаминовых рецепторов, что приводит к торможению гипофизом секреции пролактина, основного гормона лактогенеза. Снижение уровня пролактина

