

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Руководителя
Россельхознадзора



Е.А.Непоклонов

15 АВГ 2012

ИНСТРУКЦИЯ

по применению препарата Сафродерм настойки в качестве
антисептического, ранозаживляющего и противовоспалительного средства
для собак и кошек

(организация-разработчик: ЗАО фирма «НПВиЗЦ «Ветзвероцентр», Москва)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Сафродерм настойка (Tinctura Saphrodermae).

Международное непатентованное наименование: Софора японская, крапива двудомная.

2. Лекарственная форма: раствор для наружного применения.

Сафродерм настойка содержит в 1 мл в качестве действующих веществ 250 мг софоры японской и 100 мг крапивы двудомной, а в качестве вспомогательного вещества этиловый спирт до 1 мл.

По внешнему виду Сафродерм настойка представляет собой прозрачную жидкость от светло-коричневого до коричневого цвета с зеленоватым оттенком.

3. Сафродерм настойку выпускают расфасованной по 10, 20, 50, 100 и 200 мл в стеклянные или полимерные флаконы, укупоренные резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками, а также по 20, 30, 50, 70, 80 или 100 мл в полимерные флаконы с механической распылительной головкой, соответствующей вместимости.

4. Сафродерм настойку хранят в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном от света месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 2⁰С до 25⁰С.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 2 года со дня производства.

Запрещается применять Сафродерм настойку по истечении срока годности.

5. Лекарственный препарат следует хранить в местах, недоступных для детей.

6. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. Фармакологические свойства

7. Сафродерм настойка относится к антибактериальным лекарственным препаратам растительного происхождения.

Входящие в состав лекарственного препарата биологически активные вещества обладают противовоспалительными, кровоостанавливающими, ранозаживляющими и антисептическими свойствами, способствуют активизации процессов, эпителизации и регенерации поврежденных тканей.

Сафродерм настойка по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

III. Порядок применения

8. Сафродерм настойку применяют для лечения асептических и гнойных ран, ссадин и язв, а также отитов у собак и кошек.

9. Противопоказаний для применения препарата Сафродерм настойка не установлено.

10. Для лечения асептических и инфицированных ран, порезов, царапин и язв лекарственный препарат разводят кипяченой или дистиллированной водой в соотношении 1:20 и применяют в виде орошения, промывания, влажных повязок или смазывания пораженной поверхности смоченным ватным тампоном или салфеткой.

Обработку проводят два-три раза в день до выздоровления.

При отитах различной этиологии для удаления ушной серы, грязи и воспалительного экссудата ушные раковины и слуховой проход обрабатывают тампоном, смоченным настойкой, затем закапывают в каждое ухо по 1-3 капли настойки и слегка массируют основание ушной раковины.

Обработку проводят один-два раза в день в течение 3-7 дней до клинического выздоровления животного.

11. Симптомы передозировки лекарственного препарата не установлены.

12. Особенности действия при первом применении и при отмене лекарственного препарата не выявлено.

13. Следует избегать пропусков при применении очередной дозы лекарственного препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае пропуска одной дозы применение препарата возобновляют в той же дозировке и по той же схеме.

14. Побочных явлений и осложнений при применении лекарственного препарата в соответствии с инструкцией не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата и возникновении аллергических реакций использование лекарственного препарата прекращают и назначают антигистаминные препараты.

15. Применение препарата Сафродерм настойка не заменяет и не исключает использование антибактериальных и других лекарственных средств.

16. Лекарственный препарат не предназначен для применения продуктивным животным, сроки убоя животных после применения препарата не регламентируются.

IV. Меры личной профилактики

17. При работе с Сафродерм настойкой следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. При работе с препаратом запрещается пить, курить и принимать пищу. После работы с лекарственным препаратом вымыть руки с мылом.

18. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Сафродерм настойкой. При случайном попадании лекарственного препарата на кожу его необходимо смыть водой с мылом, при попадании в глаза – промыть их в течение нескольких минут большим количеством проточной воды.

В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании лекарственного препарата в организм человека необходимо немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению или этикетку).

19. Пустую тару из-под Сафродерм настойки запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

20. Организация-производитель: ЗАО фирма Научно-производственный ветеринарный и звероводческий центр «Ветзвероцентр», 129337, Москва, Хибинский проезд, дом 2.

Адрес места производства: ЗАО фирма Научно-производственный ветеринарный и звероводческий центр «Ветзвероцентр», 129337, Москва, Хибинский проезд, дом 2.

Инструкция разработана ЗАО фирма Научно-производственный ветеринарный и звероводческий центр «Ветзвероцентр», 129337, Москва, Хибинский проезд, дом 2.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

Номер регистрационного удостоверения: