

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Руководителя
Россельхознадзора



ИНСТРУКЦИЯ

по применению Азинокс плюс при цестодозах и нематодозах собак

(Организация-разработчик: ООО «НВЦ Агроветзащита», Россия, 129329, г. Москва, ул. Кольская д.1, стр.1)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Азинокс плюс (Azinox plus).

Международное непатентованное наименование: празиквантел, пирантела памоат.

2. Лекарственная форма: таблетки для орального применения.

Азинокс плюс в качестве действующих веществ в 1 таблетке содержит: празиквантел (азинокс) - 50 мг и пирантела памоат - 150 мг, а также вспомогательные вещества: лактозу и крахмал картофельный.

3. По внешнему виду Азинокс плюс представляет собой плоские таблетки желтого цвета с риской и логотипом.

Срок годности при соблюдении условий хранения – 3 года со дня производства. Неиспользованную часть таблетки рекомендуется поместить в блистер и хранить при заявленных условиях до следующей дегельминтизации, но не более 3 месяцев после вскрытия упаковки.

Запрещается применение лекарственного препарата по истечении срока годности.

4. Выпускают Азинокс плюс расфасованным по 3 или 6 таблеток в блистеры из поливинилхлоридной пленки. Блистеры упакованы поштучно в картонные пачки вместе с инструкцией по применению.

5. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 0°C до 25°C.

6. Азинокс плюс следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Азинокс плюс относится к комбинированным антигельминтным препаратам нематодоцидного и цестодоцидного действия.

10. Комбинация входящих в состав препарата действующих веществ обеспечивает широкий спектр его антигельминтного действия на все фазы развития круглых и ленточных гельминтов, паразитирующих у собак, в том

числе *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Uncinaria stenocephala*, *Ancylostoma caninum*, *Trichuris vulpis*, *Echinococcus granulosus*, *Echinococcus multilocularis*, *Diphyllobothrium latum*, *Dipylidium caninum*, *Multiceps multiceps* и *Taenia* spp.

Механизм действия празиквантела основан на индуцировании распада тегумента и ингибировании фумаратредуктазы, стойкой деполяризации мышечных клеток гельминтов, нарушении энергетического обмена, что вызывает паралич и гибель гельминтов и способствует их выведению из желудочно-кишечного тракта.

Празиквантел быстро всасывается в желудочно-кишечном тракте, достигая максимальной концентрации в плазме крови через 60 минут; связывается с сывороточными белками крови (70-80%), частично метаболизируется в печени, реэкскретируется в кишечник, выводится из организма в основном с мочой (до 80%) в течение 24 часов.

Механизм действия пирантела памоата заключается в блокировании нейромышечной передачи посредством стойкой деполяризации постсинаптических мембран (холинергический агонист), нарушении проницаемости клеточных мембран, что приводит к параличу и гибели гельминтов. Пирантел памоат плохо всасывается, что обеспечивает его пролонгированное действие на гельминтов в кишечнике, выводится из организма в основном в неизменном виде с фекалиями (93%).

Азинокс плюс по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывает местно-раздражающего и резорбтивно-токсического действия, не обладает эмбриотоксическими, тератогенными свойствами. Хорошо переносится собаками разных пород и возрастов.

III. Порядок применения

11. Азинокс плюс назначают собакам с профилактической и лечебной целью при нематодозах (токсокароз, токскариндоз, унцинариоз, анкилостомоз) и цестодозах (тениоз, дипилидиоз, эхинококкоз, дифиллоботриоз, мезоцестоидоз).

12. Противопоказанием к применению Азинокса плюс является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата (в том числе в анамнезе), выраженные нарушения функции почек и печени. Не следует применять Азинокс плюс истощенным, больным инфекционными болезнями и выздоравливающим животным.

13. Азинокс плюс задают собакам однократно, индивидуально в утреннее кормление с небольшим количеством корма или вводят принудительно из расчета 1 таблетка на 10 кг массы животного.

Предварительной голодной диеты и применения слабительных средств не требуется.

С лечебной целью собак дегельминтизируют по показаниям, с профилактической целью - ежеквартально в терапевтической дозе, а также перед каждой вакцинацией.

Прифермерских и приотарных собак против возбудителей тениозов дегельминтизируют с декабря по апрель через каждые 45 дней, с мая по ноябрь - через каждые 30 дней, проводя обработки на специально отведенных

зацементированных площадках, которые обезвреживают раствором хлорной извести (2,7% активного хлора) с нормой расхода 1 л/м² поверхности.

14. Симптомы передозировки препарата не выявлены.

15. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении или отмене не установлено.

16. Дегельминтизацию беременных и лактирующих самок при необходимости проводят под наблюдением ветеринарного врача за 3 недели до предполагаемых родов и через 2-3 недели после родов. Препарат не следует применять щенкам до 3-недельного возраста.

17. При проведении дегельминтизации следует придерживаться рекомендуемых инструкцией сроков. В случае пропуска очередной обработки применение препарата возобновляют в той же дозе и по той же схеме.

18. Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам лекарственного препарата и появлении аллергических реакций применение Азинокса плюс прекращают и назначают животному антигистаминные и симптоматические средства.

19. Азинокс плюс не следует применять одновременно с противопаразитарными препаратами, содержащими пиперазин, и средствами, ингибирующими холинэстеразу.

20. Азинокс плюс не предназначен для применения продуктивным животным.

III. Меры личной профилактики

21. При работе с Азиноксом плюс следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

22. При работе с Азиноксом плюс запрещается пить, курить и принимать пищу. После работы с лекарственным препаратом вымыть руки с мылом.

Пустую упаковку из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

23. Людям с гиперчувствительностью к действующим веществам лекарственного препарата следует избегать прямого контакта с Азиноксом плюс. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании лекарственного препарата в организм человека необходимо немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению или этикетку).

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения

ООО «АВЗ С-П», Россия, 141305, Московская область, г. Сергиев-Посад, ул. Центральная, д.1

Наименование и адрес организации, уполномоченной владельцем или держателем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя

ООО «АВЗ С-П», Россия, 141305, Московская область, г. Сергиев-Посад, ул. Центральная, д.1

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Азинокса плюс, утвержденная Россельхознадзором 30 декабря 2010 года.

Номер регистрационного удостоверения

77-3-7.0-0141/ПВР-2-1.3/0340