



ИНСТРУКЦИЯ
по применению Мастийета Голд для лечения
маститы у коров в период лактации

(организация-разработчик: «Интервет Интернешнл Б.В.»,
Вим Де Кёрверстраат 35, а/я 31 5830 АА Боксмеер, Нидерланды/
Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 35, P.O. Box 31 5830 AA Boxmeer,
The Netherlands).

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Мастийет Голд (Mastijet® Gold).

Международное непатентованное название: цефепим и преднизолон.

2. Лекарственная форма: суспензия для интрацистернального введения.

В одном шприце-дозаторе Мастийет Голд содержится в качестве действующих веществ: 300 мг цефепима (в форме натриевой соли) и 20 мг преднизолона, а в качестве вспомогательных веществ: глицерол моностеарат, алюмосиликат кальция и натрия, арахисовое масло.

3. По внешнему виду Мастийет Голд представляет собой суспензию бело-желтого цвета.

Срок годности Мастийет Голд при соблюдении условий хранения 36 месяцев с даты производства. После вскрытия содержимое шприца-дозатора необходимо сразу использовать.

Запрещается использовать Мастийет Голд по истечении срока годности.

4. Мастийет Голд выпускают расфасованным по 8 г в стерильных пластиковых шприцах-дозаторах для интрацистернального введения, наконечники которых укупорены пластиковыми колпачками. Шприцы-дозаторы упаковывают по 20 штук в картонные коробки вместе с соответствующим количеством очищающих салфеток. В каждую коробку вкладывают инструкцию по применению.

5. Мастийет Голд хранят в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в защищенном от прямых солнечных лучей при температуре от 2°C до 25°C.

6. Лекарственный препарат следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в

соответствии с требованиями законодательства.

8. Мاستиет Голд отпускают без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Мاستиет Голд относится к комбинированным антибактериальным препаратам для интрацистернального введения.

10. Цефапирин, входящий в состав Мاستиет Голд, относится к группе беталактамов, обладает бактерицидным действием в отношении большинства грамположительных и грамотрицательных бактерий - основных возбудителей мастита коров, в том числе *E.coli*, *Streptococcus uberis*, *Staphylococcus aureus*, *Klebsiella spp*, *Arcanobacterium pyogenes*, коагулазонегативных стафилококков, *Streptococcus dysagalactiae*, *Streptococcus agalactiae*.

Механизм действия цефапирина в бактериальной клетке заключается в блокировании ферментов транспептидаз, связывающих пептидогликан клеточной стенки, в результате чего бактериальная клетка разрушается.

Преднизолон - глюкокортикостероид, обладая противовоспалительным и противоаллергенным действием, позволяет максимально снизить воспалительную реакцию и отечность тканей вымени.

При интрацистернальном введении цефапирин и преднизолон быстро проникают в паренхиму вымени, сохраняясь в терапевтических концентрациях на протяжении 12 часов; в кровь поступают в незначительной степени, выводятся из организма преимущественно с молоком и незначительно с мочой.

По степени воздействия на организм Мاستиет Голд относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76). Не оказывает раздражающего действия на паренхиму вымени.

III. Порядок применения

11. Мاستиет Голд предназначен для лечения клинических и субклинических форм мастита у коров в период лактации.

12. Запрещается использовать Мاستиет Голд в сухостойный период и животным с гиперчувствительностью к беталактамным антибиотикам. Не следует применять очищающие салфетки для обработки сосков с открытыми ранами.

13. Мاستиет Голд вводят в пораженную четверть вымени коровы в разовой дозе 8 г (содержимое 1 шприца-дозатора) 2-4 кратно с интервалом 12 часов.

Перед введением препарата из пораженной четверти вымени полностью выдаивают молоко (секрет), обеззараживают и утилизируют его;

- тщательно дезинфицируют кончик соска прилагаемой очищающей салфеткой;

- удаляют верхушку защитного колпачка с наконечника шприца-дозатора, вводят наконечник в молочный канал (на 5 мм) или удаляют колпачок полностью и вводят наконечник в сосковый канал на всю его длину. Предпочтительным способом является частичное введение, при невозможности

его выполнения наконечник шприца-дозатора вводят на всю его длину, при этом эффективность лечения не снижается.

- содержимое шприца-дозатора (1 доза) осторожно выдавливают в пораженную четверть вымени;

- извлекают шприц-дозатор, пережимают верхушку соска и массируют сосок снизу вверх для лучшего распределения лекарственного препарата.

14. Симптомов передозировки при применении лекарственного препарата в соответствии с настоящей инструкцией не установлено.

15. Особенности действия лекарственного препарата при первом введении или при его отмене не выявлено.

16. Мاستиет Голд разрешено использовать стельным и лактирующим животным.

17. Следует избегать пропусков введения очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. При пропуске одной или нескольких доз препарата лечение необходимо возобновить как можно скорее в предусмотренной дозировке и схеме применения.

18. При применении Мاستиет Голд в соответствии с инструкцией по применению побочных явлений и осложнений, как правило, не отмечается. В случае появления аллергических реакций использование препарата прекращают и при необходимости назначают антигистаминные препараты или другое симптоматическое лечение.

19. Применение Мاستиет Голд не исключает использование других лекарственных средств, за исключением препаратов для интрацистернального введения.

20. Молоко в пищевых целях может быть использовано не ранее, чем через 132 часа (11 доек) после последнего введения Мاستиет Голд. Молоко из здоровых четвертей вымени, полученное ранее установленного срока, можно использовать после термической обработки в корм животным. Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 96 часов (4 суток) после последнего применения лекарственного препарата. В случае вынужденного убоя ранее указанного срока, мясо животных можно использовать для кормления пушных зверей.

IV. Меры личной профилактики

21. При работе с Маститет Голд следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

22. Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы с лекарственным препаратом следует тщательно вымыть с мылом лицо и руки.

Пустые упаковки из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

Людам с гиперчувствительностью к пенициллинам и цефалоспорином следует избегать прямого контакта с лекарственным препаратом.

23. При попадании лекарственного препарата в глаза или на слизистые оболочки следует немедленно промыть их чистой водой, при необходимости следует обратиться к врачу. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании Мاستиет Голд в организм человека следует обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Наименование производственной производителя препарата для применения.	и площадки лекарственного ветеринарного	адрес «Интервет Интернешнл Б.В.» (Вим Де Кёрверстраат 35, а/я 31 5830 АА Боксmeer, Нидерланды) / Intervet International B.V. (Wim de Körverstraat 35, P.O. Box 31 5830 AA Boxmeer, The Netherlands).
---	--	--

Наименование, уполномоченной владелец удостоверения препарата на потребителя.	адрес организации, держателем или регистратора лекарственного препарата на принятие претензий от	ООО «Интервет» (Россия, 143345, Московская область, Наро-Фоминский район, пос. Селятино, ул. Промышленная, дом 81/1).
--	---	--

С утверждением настоящей инструкции, утрачивает силу инструкция по применению Мاستиет Голд, утвержденная Россельхознадзором 11.07.2011 г.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

Номер регистрационного удостоверения 52-3-12.15-2317-ПВЧ-3-5.0/03209