

Одобрено на заседании  
Совета по ветеринарным препаратам  
Протокол № 92 от 20 октября 2017 года.

## ИНСТРУКЦИЯ по применению препарата «Бравекто Спот Он» (Раствор для точечного нанесения)

### 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Бравекто Спот Он (Bravecto Spot On).

Существуют следующие разновидности препарата:

«Бравекто Спот Он для собак 112,5 мг» (Раствор для точечного нанесения для собак очень мелких пород (2 – 4,5 кг));

«Бравекто Спот Он для собак 250 мг» (Раствор для точечного нанесения для собак мелких пород (>4,5 – 10 кг));

«Бравекто Спот Он для собак 500 мг» (Раствор для точечного нанесения для собак средних пород (>10 – 20 кг));

«Бравекто Спот Он для собак 1000 мг» (Раствор для точечного нанесения для собак крупных пород (>20 – 40 кг));

«Бравекто Спот Он для собак 1400 мг» (Раствор для точечного нанесения для собак очень крупных пород (>40 – 56 кг));

«Бравекто Спот Он для кошек 112,5 мг» (Раствор для точечного нанесения для кошек мелких пород (1,2 – 2,8 кг));

«Бравекто Спот Он для кошек 250 мг» (Раствор для точечного нанесения для кошек средних пород (>2,8 – 6,25 кг));

«Бравекто Спот Он для кошек 500 мг» (Раствор для точечного нанесения для кошек крупных пород (>6,25 – 12,5 кг)).

1.2. В 1,0 мл препарата содержится 280 мг флурагланера и вспомогательные вещества до 1 мл.

1.3. По внешнему виду препарат представляет собой прозрачный раствор от бесцветного до желтого цвета.

1.4. Бравекто Спот Он выпускают в пипетках, упакованных в ламированные алюминиевые пакеты-саше по 0,4 мл (Бравекто Спот Он 112,5 мг, для кошек мелких пород); 0,89 мл (Бравекто Спот Он 250 мг, для кошек средних пород); 1,79 мл (Бравекто Спот Он 500 мг, для кошек крупных пород); 0,4 мл (Бравекто Спот Он 112,5 мг, для собак очень мелких пород); 0,89 мл (Бравекто Спот Он 250 мг, для собак мелких пород); 1,79 мл (Бравекто Спот Он 500 мг, для собак средних пород); 3,57 мл (Бравекто Спот Он 1000 мг, для собак крупных пород) и 5,0 мл (Бравекто Спот Он 1400 мг, для собак очень крупных пород), закрывающиеся колпачком из полиэтилена высокой плотности. Пипетки упакованы по 1 или 2 штуки в картонные коробки вместе с инструкцией по применению.

1.5. Препарат хранят в защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от плюс 2°C до плюс 30°C. Не замораживать.

1.6. Срок годности препарата – 2 года от даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортировки.

### 2. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

2.1. Флурагланер, входящий в состав препарата, является акарицидом и инсектицидом. Он эффективен против иксодовых клещей (*Ixodes spp.*, *Dermacentor spp.*, *Haemaphysalis elliptica* и *Rhipicephalus sanguineus*), а также *Sarcoptes spp.*, *Otodectes spp.* и блох (*Ctenocephalides spp.*).

Флурагланер является сильнодействующим ингибитором некоторых частей нервной системы членистоногих, действуя антагонистически на потенциалнезависимые каналы-переносчики для ионов хлора (ГАМК-рецептор и глютамат-рецептор).

2.2. После местного применения флурагланер быстро абсорбируется в шерстный покров, кожу и прилегающие ткани, откуда он медленно поступает в сосудистую систему. Уровень плато достигается в плазме через 7 – 63 дней после применения, после чего концентрация медленно снижается. Флурагланер хорошо распределяется в тканях и достигает высоких концентраций в жировой ткани, печени, мышцах и почках. Длительная сохранность и медленное выведение из плазмы и отсутствие интенсивного метаболизма обеспечивают эффективные концентрации флурагланера в течение интервала времени между применением препарата. Флурагланер в неизмененном виде выводится с экскрементами и, в очень незначительной степени, с мочой.

### 3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

3.1. Бравекто Спот Он применяют кошкам и собакам для лечения и профилактики заражения клещами и блохами, а также для лечения саркоптоза, вызванного *Sarcoptes spp.*, у собак и отодектоза, вызванного *Otodectes spp.*, у собак и кошек, а также для снижения риска бабезиоза у собак. Может использоваться как часть комплексного лечения аллергического дерматита, вызываемого блохами.

Профилактический эффект от заражения блохами и клещами кошек и собак сохраняется в течение 12 недель.

Эффект после нанесения препарата развивается в течение 8 часов (от блох) и 12 часов (от клещей) для собак и в течение 12 часов (от блох) и 48 часов (от клещей) для кошек.

3.2. Непосредственно перед применением вскрывают один пакет-саше и достают пипетку. Для открытия пипетку следует удерживать у основания или за верхнюю часть ниже колпачка в вертикальном положении (наконечником вверх). Откручивающийся колпачок поворачивают в направлении или против часовой стрелки на один полный оборот. Колпачок остается на пипетке – его невозможно удалить полностью. Пипетка является открытой и готова к применению, когда ощущается щелчок от разлома уплотнения.


3.3. Метод применения и дозы для кошек:

3.3.1. Бравекто Спот Он кошкам применяют в соответствии с приведенной ниже таблицей (соответствует одной дозе 40 – 94 мг флурангера в расчете на 1 кг массы тела).

| Масса тела кошки (кг) | Активность и количество применяемых пипеток |                            |                            |
|-----------------------|---|----------------------------|----------------------------|
|                       | Бравекто Спот Он<br>112,5 мг                | Бравекто Спот Он<br>250 мг | Бравекто Спот Он<br>500 мг |
| 1,2 – 2,8             | 1   |                            |                            |
| >2,8 – 6,25           |   | 1                          |                            |
| >6,25 – 12,5          |   |                            | 1                          |

Для кошек с массой тела более 12,5 кг используют сочетание двух пипеток, которое больше всего соответствует массе тела.

3.3.2. В ходе применения препарата кошка должна стоять или лежать так, чтобы ее спина находилась в горизонтальном положении. Наконечник пипетки размещают над головой кошки.



3.3.3. Аккуратно сдавливают пипетку, нанося все содержимое пипетки непосредственно на кожу кошки. Для кошек весом до 6,25 кг препарат следует наносить в одном месте, в области основания черепа; для кошек весом свыше 6,25 кг – в двух местах.

3.4. Метод применения и дозы для собак:


3.4.1. Бравекто Спот Он собакам применяют в соответствии с приведенной ниже таблицей (соответствует одной дозе 25 – 56 мг флурангера в расчете на 1 кг массы тела).

| Масса тела собаки (кг) | Активность и количество применяемых пипеток |                         |                         |                          |                          |
|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                        | Бравекто Спот Он 112,5 мг                   | Бравекто Спот Он 250 мг | Бравекто Спот Он 500 мг | Бравекто Спот Он 1000 мг | Бравекто Спот Он 1400 мг |
| 2 – 4,5                | 1   |                         |                         |                          |                          |
| >4,5 – 10              |   | 1                       |                         |                          |                          |
| >10 – 20               |   |                         | 1                       |                          |                          |
| >20 – 40               |   |                         |                         | 1                        |                          |
| >40 – 56               |   |                         |                         |                          | 1                        |

Для собак с массой тела более 56 кг используют сочетание двух пипеток, которое больше всего соответствует массе тела.

3.4.2. В ходе применения препарата собака должна стоять или лежать так, чтобы ее спина находилась в горизонтальном положении. Наконечник пипетки размещают вертикально над участком кожи между лопатками собаки.

3.4.3. Аккуратно сдавливают пипетку, нанося все содержимое пипетки непосредственно на кожу собаки в одном месте (в случае небольшого объема пипетки) или нескольких местах вдоль позвоночника от плеча до основания хвоста. Не следует наносить чрезмерное количество раствора в одно место, поскольку это может вызвать стекание некоторой части раствора с животного.



3.5. Для оптимального контроля заражения блохами и клещами данный препарат следует применять у собак и кошек с интервалами 12 недель.

3.6. Не применять в случае известной аллергии к действующему веществу или компонентам препарата.

3.7. Собакам препарат можно применять в период беременности и лактации. О применении препарата кошкам в период беременности и лактации нет данных.

У собак в отдельных случаях в месте применения могут отмечаться местные кожные реакции, в частности, покраснение или выпадение шерстного покрова. У кошек в отдельных случаях в месте применения могут отмечаться кожные реакции, в частности, покраснение или зуд. Вскоре после применения у кошек возможны вялость/судороги/анорексия или тошнота/повышенное слюноотделение.

3.8. Передозировка. Не отмечено никаких побочных эффектов после применения у щенков в возрасте 8 – 9 недель (массой тела 2,0 – 3,7 кг) и котят в возрасте 11 – 13 недель (массой тела 1,2 – 1,5 кг) передозировки вплоть до 5-кратной максимальной рекомендуемой дозы 3 раза с более краткими интервалами, чем рекомендуется (с интервалами 8 недель).

3.9. Предостережения при применении животным.

Не допускать попадания данного препарата в глаза животным.

Нельзя наносить непосредственно на поврежденные участки кожи.

Не допускать контакта с обработанными участками (места применения) до высыхания.

Собакам и кошкам не следует позволять плавать в водоемах, погружать в воду или мыть их в течение 3 дней после применения препарата.

В связи с отсутствием информации, данный препарат не следует применять: щенкам менее 8 недельного возраста и/или собакам с массой тела менее 1,2 кг; котятам менее 11-недельного возраста и/или кошкам с массой тела менее 1,2 кг.

#### 4 . МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1. При работе с препаратом следует соблюдать общепринятые правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные для работы с ветеринарными лекарственными средствами.

4.2. В случае попадания препарата на кожу или в глаза, необходимо тщательно промыть участок, на который попал препарат, чистой водой. После использования препарата необходимо вымыть руки.

4.3. Этот препарат является легковоспламеняющимся. Держать вдали от источников тепла, открытого огня или других источников возгорания.

#### 5. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

5.1. В случае возникновения осложнений после применения препарата его использование прекращают, и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на территории которого он находится.

Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения всех правил по применению препарата в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия препарата на организм животного ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, пишется акт отбора проб и направляется в Государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» для подтверждения на соответствие требованиям нормативных документов.

#### 6. ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

6.1. «Патеон Мэньюфэкчуринг Сервисез ЛЛС» (Patheon Manufacturing Services LLC), США.

Инструкция подготовлена специалистом по регистрации представительства «Интерверт Интернэшнл Б.В.» (Нидерланды) в Республике Беларусь Терешко А.А. и заведующим кафедрой микробиологии и вирусологии УО ВГАВМ Вербицким А.А.

|  |               |
|--|---------------|
| Департамент ветеринарного и продовольственного<br>надзора Министерства сельского хозяйства и<br>продовольствия Республики Беларусь |               |
| Совет по ветеринарным препаратам   |               |
| ОДОБРЕНО   |               |
| Председатель   | <i>Леб</i>    |
| Секретарь  | <i>СВЛЧ-</i>  |
| Эксперт  | <i>М.И.С.</i> |
| 20 10 2017. протокол № 92  |               |