

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

28.11.2018

ИНСТРУКЦИЯ
по ветеринарному применению ветеринарного препарата
Капли глазные и интраназальные Анандин

(организация-разработчик: ООО «Научно-исследовательское общество «Медитэр»
197046, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Посадская, д.4 «А», литер «А»)

Номер регистрационного удостоверения: 78-3-7.12-0688 № ПВР-3-2.0/00339

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Капли глазные и интраназальные Анандин.

Международное непатентованное и химическое наименование: глюкаминопропилкарбакридон.

2. Лекарственная форма: капли глазные и интраназальные.

Лекарственный препарат капли глазные и интраназальные Анандин содержит в 1 мл раствора в качестве действующего вещества глюкаминопропилкарбакридон – 20 мг, а также вспомогательные компоненты вещества: глицерин и воду для инъекций.

3. По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой прозрачную жидкость светло-зеленого цвета.

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения – 2 года со дня производства.

Запрещается применять Капли глазные и интраназальные Анандин по истечении срока годности.

4. Выпускают капли глазные и интраназальные Анандин расфасованными по 5 мл во флаконы из нейтрального стекла, укупоренные резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками. Каждый флакон упаковывают в картонные коробки вместе с инструкцией по применению.

5. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 0 °C до 25 °C.

6. Капли глазные и интраназальные Анандин следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Капли глазные и интраназальные Анандин относятся к фармакотерапевтической группе - иммуномодуляторы.

10. Глюкоминопропилкарбакридон (Анадин), входящий в состав капель, относится к низкомолекулярным индукторам цитокинов, обладает противовоспалительным и ранозаживляющим действием, стимулирует выработку эндогенного интерферона, повышает функциональную активность Т-лимфоцитов и макрофагов, активизирует продукцию прововоспалительных цитокинов.

Максимальная концентрация Анандина в крови наблюдается через час после введения. Накопления в организме не происходит, препарат полностью выводится через почки в неизмененном виде. Капли глазные и интраназальные Анандин по степени воздействия на организм относятся к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76). Лекарственный препарат не обладает местно-раздражающим, резорбтивно-токсическим и сенсибилизирующим действием.

III. Порядок применения

11. Капли глазные и интраназальные Анандин применяют в комплексной терапии конъюнктивитов и ринитов различной этиологии у собак и кошек.

12. Противопоказанием к применению лекарственного препарата служит повышенная индивидуальная чувствительность животного к входящим в состав препарата компонентам.

13. При работе с каплями глазными и интраназальными Анандин следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с каплями глазными и интраназальными Анандин. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Пустые флаконы из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

14. Специальные исследования на беременных и лактирующих животных не проводились. Возможность применения капель глазных и интраназальных Анандин самкам в период беременности и вскармливания приплода определяет лечащий врач на основании оценки отношения пользы к возможному риску применения препарата.

15. При конъюнктивитах препарат закапывают по 2-3 капли за нижнее веко два раза в день, при ринитах – по 2-4 капли в каждый носовой ход два-три раза в день. Лечение проводят до выздоровления животного, но не более 14 дней. Во время лечения препаратом не требуется специальных условий содержания и кормления животных.

16. Побочных явлений и осложнений при применении капель глазных и интраназальных Анандин в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к активным компонентам препарата и появлении признаков выраженного раздражения применение лекарственного средства прекращают и при необходимости назначают антигистаминные средства.

17. Симптомы передозировки при применении лекарственного препарата не выявлены.

18. Капли глазные и интраназальные Анандин совместимы с другими лекарственными препаратами и кормовыми добавками.

19. Особеностей действия при начале приёма препарата и при его отмене не установлено.

20. Следует избегать пропуска очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению терапевтической активности. В случае пропуска одной дозы применение препарата возобновляют в той же дозе и по той же схеме.

21. Капли глазные и интраназальные Анандин не предназначены для применения продуктивным животным.

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.

ООО «Научно-исследовательское общество «Медитэр», 196608, Санкт-Петербург, г. Пушкин, шоссе Подбельского д.9, лит. А.

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

ООО «Научно-исследовательское общество «Медитэр», 196608, Санкт-Петербург, г. Пушкин, шоссе Подбельского д.9, лит. А. Тел . +7 812 4666632, E-mail : mediterer@peterlink.ru