

ИНСТРУКЦИЯ
по применению Раствора Рингера-Локка для лечения животных
при обезвоживании и интоксикации организма, кровопотерях,
а также для промывания глаз и ран

(Организация-разработчик: ЗАО «Мосагроген»,
142000, Московская область, г. Домодедово, Кутузовский проезд, д.10-77)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Раствор Рингера-Локка (Solutio Ringer-Locke).

Международное непатентованное наименование: раствор Рингера-Локка.

2. Лекарственная форма: раствор для инъекций.

Раствор Рингера-Локка в качестве действующих веществ в 1 мл содержит натрия хлорида – 8 мг, калия хлорида - 0,2 мг, кальция хлорида - 0,2 мг, натрия гидрокарбоната - 0,2 мг, глюкозы - 1 мг, а в качестве растворителя воду для инъекций.

3. По внешнему виду препарат представляет собой прозрачную бесцветную жидкость.

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя - 2 года со дня производства.

Запрещается применение препарата по истечении срока годности.

4. Раствор Рингера-Локка выпускают расфасованным по 100мл в стеклянных флаконах соответствующей вместимости, укупоренных резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками. Каждую потребительскую упаковку снабжают инструкцией по применению.

5. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 0 °C до 25 °C.

6. Раствор Рингера-Локка следует хранить в недоступном для детей месте.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Раствор Рингера-Локка отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Раствор Рингера-Локка относится к препаратам, влияющим на водно-электролитный баланс в организме.

10. Препарат используется как регидратирующее средство, для стабилизации водного и электролитного состава крови, оказывает дезинтоксикационное действие.

Раствор Рингера-Локка по степени воздействия на организм относится к веществам малоопасным (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

III. Порядок применения

11. Раствор Рингера-Локка применяют животным при диспепсиях и других заболеваниях, сопровождающихся обезвоживанием и интоксикацией организма, кровопотерях, а также для промывания ран и глаз.

12. Противопоказанием для применения препарата является индивидуальная повышенная чувствительность животного. При выраженном нарушении выделительной функции почек внутривенное введение раствора Рингера-Локка противопоказано.

13. Раствор Рингера-Локка применяют подкожно или внутривенно в следующих дозах:

Животные	Разовая максимальная доза на животное, в мл
Лошади, крупный рогатый скот	1000 - 3000
Мелкий рогатый скот	100 - 300
Телята до одного года	200 - 400
Ягнята, поросыта	25 - 100

Дозы и сроки применения зависят от массы животного и течения болезни. При подкожном введении дозу препарата вводят дробно в разные места.

14. Симптомы передозировки у животных не выявлены.

15. Особеностей действия лекарственного препарата при его первом применении и при отмене не выявлено.

16. Противопоказаний и особенностей применения лекарственного препарата беременным, лактирующим животным и молодняку не выявлено.

17. В случае пропуска одной дозы применение препарата возобновляют как можно скорее в той же дозе и по той же схеме. Не следует вводить двойную дозу, чтобы восместить пропущенное введение.

18. При применении Раствора Рингера-Локка в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается. Применение препарата в больших количествах может привести к развитию хлоридного ацидоза, гипергидратации. При таких осложнениях уменьшают дозу или препарат отменяют.

19. Применение Раствора Рингера-Локка не исключает использование других лекарственных средств.

20. Продукты животноводства в период применения Раствора Рингера-Локка используют без ограничений.

IV. Меры личной профилактики

21. При работе с препаратом Раствор Рингера-Локка следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

22. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Раствором Рингера-Локка. Во время работы с лекарственным препаратом запрещается пить, курить и принимать пищу. Флаконы из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

23. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаза, их необходимо промыть большим количеством воды. В случае возникновения аллергических реакций или при случайном попадании лекарственного препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Наименование производственной производителя препарата для применения.	и адрес площадки лекарственного ветеринарного	ЗАО «Мосагроген» Российская Федерация, 117545, г. Москва, 1-ый Дорожный проезд, д.1. т/ф (495) 744-06-45
---	---	--

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.	ЗАО «Мосагроген» Российская Федерация, 142000, Московская обл., г. Домодедово, Кутузовский пр., д.10-77.
---	--

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция, утвержденная Россельхознадзором 28.04.2012 г.

Номер регистрационного удостоверения 77-3-2.12-0695 №ПВР-3-2.9/00127