

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

Н.А. Власов

27/11/2011

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Гепатовета собакам и кошкам при
заболеваниях печени различной этиологии

(организация-производитель ООО НПО «АПИ-САН»,
пос. Новый Милет, Московская область)

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Гепатовет (Hepatovet).

Международное непатентованное наименование: лецитин + метионин + орнитин + расторопша + бессмертник.

2. Лекарственная форма: суспензия для орального применения. Препарат в качестве действующих веществ в 1 мл содержит эссенциальные фосфолипиды - 60 мг, метионин - 100 мг, L-орнитин - 50 мг, расторопши пятнистой экстракт - 15 мг, травы бессмертника - 15 мг, а также вспомогательные компоненты: сорбат калия - 1,5 мг, бензоат натрия - 1,5 мг, натрия карбоксиметилцеллюлоза - 1,5 мг, твин-80 - 6 мг и воду дистиллированную - до 1 см³.

3. Срок годности лекарственного препарата в закрытой упаковке при соблюдении условий хранения - 2 года со дня изготовления, после вскрытия флакона - не более 21 суток.

Запрещается применение Гепатовета по истечении срока годности.

4. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, в сухом защищенном от света месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 2°C до 25°C.

5. Гепатовет следует хранить в местах, недоступных для детей.

6. Специальных мер предосторожности при уничтожении неиспользованного лекарственного средства не требуется.

II. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

7. Гепатовет - гепатотропный лекарственный препарат в состав которого входят эссенциальные фосфолипиды, флавоноиды, аминокислоты - метионин и орнитин.

Комплекс биологически активных веществ в препарате улучшает функциональное состояние печени и её дезинтоксикационную функцию, способствует сохранению и восстановлению структуры гепатоцитов; нормализует уровень аммиака в организме животных, ускоряет регенерацию клеток печени.

Гепатовет по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в терапевтических дозах не оказывает эмбриотоксического, тератогенного, канцерогенного и сенсибилизирующего действия.

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

8. Гепатовет назначают собакам и кошкам самостоятельно или в составе комплексной терапии при острых и хронических заболеваниях печени различной этиологии, для нормализации функции и регенерации печени после эндо- и экзотоксикозов, соматических и инфекционных заболеваний, а также для снижения отрицательного влияния лекарственных средств, обладающих гепатотоксичностью.

9. Противопоказанием к применению Гепатовета является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам лекарственного препарата, тяжелая печеночная недостаточность, печеночная энцефалопатия и эпилепсия.

10. Препарат применяют собакам и кошкам перорально, индивидуально с небольшим количеством корма или вводят принудительно с помощью шприца-дозатора 2 – 3 раза в день в течение 3 – 5 недель, в дозах указанных в таблице:

Масса животного	Разовая доза суспензии, мл	Суточная доза суспензии, мл
Собаки		
до 10 кг	1	2 – 3
11 – 20 кг	2	4 – 6
21 – 30 кг	3	6 – 9
31 – 40 кг	4	8 – 12
от 41 и более	5	10 – 15
Кошки		
до 3 кг	1	2 – 3
3 – 6 кг	2	4 – 6
от 7 и более	3	6 – 9

Перед применением суспензию во флаконе следует тщательно взболтать в течение 1-2 минут.

При необходимости курс лечения повторяют через 2 – 3 недели.

11. Симптомы передозировки у животных не выявлены.

12. При применении Гепатовета в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений у животных, как правило, не наблюдается. У отдельных животных через 10 – 15 минут после применения лекарственного препарата отмечается гиперсаливация, которая самопроизвольно прекращается и не требует применения лекарственных средств.

13. В случае появления аллергических реакций использование препарата прекращают и назначают животному антигистаминные и симптоматические средства.

14. При пропуске приема одной или нескольких доз лекарственного препарата его применение возобновляют в тех же дозировках и по той же схеме.

15. Гепатовет совместим с кормами, лекарственными средствами и кормовыми добавками.

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

16. При проведении лечебно-профилактических мероприятий с использованием Гепатовета следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами.

17. Пустую тару из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

18. Организация-производитель: ООО НПО «Апи-Сан», Московская обл., Балашихинский р-он, пос. Новый Милет, Полтевское шоссе, владение 4.

Инструкция разработана ООО «АПИ-САН»; 117437, г. Москва, ул. Пролетарская, д.2, а/я 77

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГУ «ВГНКИ».