

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора А. ВЛАСОВ



ИНСТРУКЦИЯ
по применению Беафар ошейника инсектоакарицидного
для кошек

(организация-разработчик: фирма «Beaphar B.V.», P.O. Box 7, 8100
AA Raalte, Нидерланды)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Беафар ошейник инсектоакарицидный для кошек (Beaphar collar insectoakaricidal for Cat).

Международное непатентованное наименование: диазинон.

2. Лекарственная форма: полимерная лента

Беафар ошейник инсектоакарицидный для кошек содержит в качестве действующего вещества диазинон (15%), а в качестве вспомогательных веществ - поливинилхлоридную смесь «С натурель», эпоксидированное соевое масло, лаурат бария, мятное масло, красящие пигменты (в зависимости от цвета ошейника): эритрозин (Е 127), черный уголь (Е 153), диоксид титана (Е 171), индиго кармин лэйк (Е 132), ренол (оранжевый, зеленый или фиолетовый пигмент) с ПВХ-носителем, пигмент желтый 83 и 13.

3. Лекарственный препарат представляет собой влагостойкую полимерную ленту длиной 35 см разных цветов (черный, желтый, красный, зеленый, синий, фиолетовый, оранжевый) для кошек и черного цвета котят.

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке - 4 года со дня производства; после вскрытия упаковки ошейник необходимо сразу использовать. Запрещается применение препарата Беафар ошейник инсектоакарицидный для кошек по истечении срока годности.

4. Выпускают Беафар ошейник инсектоакарицидный для кошек упакованным в герметично закрытый полимерный пакет, помещенный в картонную пачку вместе с инструкцией по применению.

5. Хранят ошейник в закрытой упаковке производителя отдельно от пищевых продуктов и кормов, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 5⁰C до 30⁰C.

6. Лекарственный препарат следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Беафар ошейник инсектоакарицидный для кошек отпускают без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Беафар ошейник инсектоакарицидный для кошек относится к инсектоакарицидным лекарственным препаратам из группы фосфорорганических соединений, эфирам тиофосфорной кислоты.

10. Диазинон, входящий в состав ошейника, выделяясь с поверхности ленты, переносится на кожно-волосяной покров животного и практически не всасываясь в системный кровоток оказывает контактное инсектоакарицидное действием на половозрелые и неполовозрелые фазы развития блох (*Ctenocephalides canis*, *Ctenocephalides felis*), вшей (*Linognathus setosus*), власоедов (*Trichodectes canis*) и иксодовых клещей, паразитирующих на кошках.

Механизм действия диазинона заключается в ингибировании активности холинэстеразы и стимуляции холинергических процессов в организме насекомых (вшей, кровососок и др.) и клещей (саркоптоидных, иксодовых), в результате чего происходит паралич и гибель эктопаразитов.

Беафар ошейник инсектоакарицидный для кошек и по степени воздействия на организм животных относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), не оказывает местно-раздражающего и сенсибилизирующего действия. Токсичен для пчел, рыб и других гидробионтов.

III. Порядок применения

11. Беафар ошейник инсектоакарицидный для кошек применяют для уничтожения блох, вшей, власоедов и иксодовых клещей.

12. Противопоказанием к применению является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата.

13. Беафар ошейник инсектоакарицидный для кошек применяют кошкам и котятам старше 6-месячного возраста.

После вскрытия упаковки ошейник разворачивают и одевают на животное, подгоняя по размеру так, чтобы между шеей животного и ошейником оставался промежуток в 1–1,5 см, затем закрепляют фиксатором, и излишек ленты срезают, оставляя конец длиной около 5 см.

Непрерывное ношение Беафар ошейника инсектоакарицидного для кошек обеспечивает защиту животного от насекомых и иксодовых клещей не менее 6 месяцев.

В первые дни применения ошейника возможно нападение и прикрепление иксодовых клещей на животное, но через 2-3 дня паразиты самопроизвольно отпадают.

При сильной степени заражения животного насекомыми перед применением Беафар ошейника инсектоакарицидного для кошек животное целесообразно вымыть инсектицидным шампунем, а подстилки обработать инсектицидным средством в соответствии с инструкциями по применению.

14. Симптомы передозировки при применении лекарственного препарата в соответствии с настоящей инструкцией не выявлены.

15. Особеностей действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не выявлено.

16. Не допускается применение препарата Беафар ошейник инсектоакарицидный для кошек беременным и лактирующим животным, животным моложе 6-месячного возраста.

17. Следует избегать нарушений сроков применения лекарственного препарата, поскольку это может привести к снижению эффективности обработки.

18. При применении лекарственного препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животных к диазинону возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение, признаки раздражения кожи), в этих случаях использование Беафар ошейника инсектоакарицидного для кошек прекращают, а при необходимости животному назначают десенсибилизирующую терапию.

19. Не следует одновременное применять препарат Беафар ошейник инсектоакарицидного для кошек с другими инсектицидными средствами. Информация об особенностях взаимодействия с препаратами других фармакологических групп отсутствует.

20. Беафар ошейник инсектоакарицидный для кошек не предназначен для применения продуктивным животным.

IV. Меры личной профилактики

21. При работе с Беафар ошейником инсектоакарицидным для кошек необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами. Во время работы с лекарственным препаратом не разрешается курить, пить и принимать пищу.

22. Владельцу животного при наличии на руках порезов и ссадин при манипуляциях с ошейником следует пользоваться резиновыми перчатками. После закрепления ошейника на животном следует тщательно вымыть руки теплой водой с мылом, вымыть и просушить перчатки.

В период применения Беафар ошейником инсектоакарицидным для кошек следует избегать контакта животного с маленькими детьми, особенно с грудными младенцами, а также не разрешать детям играть с ошейником.

23. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Беафар ошейником инсектоакарицидным для кошек. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Беафар ошейника инсектоакарицидного для кошек, утвержденная Роспотребнадзором 27.06.2012 г.

Наименования и адреса производственных площадок производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения

«Беафар Б.В.», Дростенкамп 3,
8101 BX Раалтэ, Нидерланды/
«Beaphar B.V.», Drostenkamp 3,
8101 BX Raalte, The Netherlands

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

«Beaphar Eastern Europe, s.r.o.»,
Revolucni 1381/III, 29001 Podebrada
Чешская Республика

Номер регистрационного удостоверения 528-3-12.16-ЗЧГИЛПВИ-3-2.1/00752

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Беафар спрей для кошек. Вид лекарственного средства: спрей. Код классификации по международной аптечной классификации: А1. Лекарственная форма: раствор-спрей. Состав: спирт этиловый 70% (70), в качестве консерванта используется бордонарин (0,005). Срок годности: 2 года. Условия хранения: при температуре от +5 до +25°C в защищенном от света месте. Препарата не содержит красителей и ароматизаторов. Показания к применению: для кошек и членохвостых грызунов (крыс, мышей) для лечения инфекций глаз, носа, ушей, мочевыводящих путей, а также для лечения язвы, фимитома и стригущей для кошек и членохвостых грызунов. Метод применения: спрей при соблюдении условий хранения и тщательного избегания попадания в глаза. Срок действия: 2 года. Помимо применения препарата Беафар спрей можно использовать для лечения других инфекций, кроме глаз, носа, ушей, язвы, фимитома и стригущей для кошек и членохвостых грызунов.

2. Выпускает: Беафар спрей выпускает иностранный производитель, имеющий право на производство, выданное в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Хранение: хранить в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от +5 до +25°C. Срок годности: 2 года. Способ применения: спрей следует применять в местах поражения, где лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

3. Беафар спрей для кошек и членохвостых грызунов без содержания гормонов.