

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора



ИНСТРУКЦИЯ
по применению Беафар ошейника инсектоакарицидного
для собак

(организация-разработчик: фирма «Beaphar B.V.», Р.О. Вох 7, 8100
АА Raalte, Нидерланды)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Беафар ошейник инсектоакарицидный для собак (Beaphar collar insectoacaricidal for Dog).

Международное непатентованное наименование: диазинон.

2. Лекарственная форма: полимерная лента

Беафар ошейник инсектоакарицидный для собак содержит в качестве действующего вещества (15%), а в качестве вспомогательных веществ - поливинилхлоридную смесь «С натурель», эпоксидированное соевое масло, лаурат бария, мятное масло, красящие пигменты (в зависимости от цвета ошейника): эритрозин (Е 127), черный уголь (Е 153), диоксид титана (Е 171), индиго кармин лэйк (Е 132), ренол (оранжевый, зеленый или фиолетовый пигмент) с ПВХ-носителем, пигмент желтый 83 и 13.

3. Лекарственный препарат представляет собой влагостойкую полимерную ленту длиной 65 см разных цветов (черный, желтый, красный, зеленый, синий, фиолетовый, оранжевый) для собак средних, мелких пород и черного цвета щенков; а также длиной 85 см черного цвета для собак крупных пород.

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке - 4 года со дня производства; после вскрытия упаковки ошейник необходимо сразу использовать. Запрещается применение Беафар ошейник инсектоакарицидный для собак по истечении срока годности.

4. Выпускают Беафар ошейник инсектоакарицидный для собак упакованным в герметично закрытый полимерный пакет, помещенный в картонную пачку вместе с инструкцией по применению.

5. Хранят ошейник в закрытой упаковке производителя отдельно от пищевых продуктов и кормов, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 5⁰С до 30⁰С.

6. Лекарственный препарат следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с законодательством.

8. Беафар ошейник инсектоакарицидный для собак отпускают без рецепта врача.

II. Фармакологические свойства

9. Беафар ошейник инсектоакарицидный для собак относится к инсектоакарицидным лекарственным препаратам из группы фосфорорганических соединений, эфирам тиофосфорной кислоты.

10. Диазинон, входящий в состав ошейника, выделяясь с поверхности ленты, переносится на кожно-волосистой покров животного и практически не всасываясь в системный кровоток оказывает контактное инсектоакарицидное действие на половозрелые и неполовозрелые фазы развития блох (*Ctenocephalides canis*, *Ctenocephalides felis*), вшей (*Linognathus setotus*), власоедов (*Trichodectes canis*) и иксодовых клещей, паразитирующих на собаках.

Механизм действия диазинона заключается в ингибировании активности холинэстеразы и стимуляции холинергических процессов в организме насекомых (вшей, кровососок и др.) и клещей (саркоптоидных, иксодовых), в результате чего происходит паралич и гибель эктопаразитов.

Беафар ошейник инсектоакарицидный для собак по степени воздействия на организм животных относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), не оказывает местно-раздражающего и сенсибилизирующего действия. Токсичен для пчел, рыб и других гидробионтов.

III. Порядок применения

11. Беафар ошейник инсектоакарицидный для собак применяют для уничтожения блох, вшей, власоедов и иксодовых клещей.

12. Противопоказанием к применению является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата.

13. Беафар ошейник инсектоакарицидный для собак применяют собакам и щенкам старше 6-месячного возраста: мелким и средним породам – ошейник длиной 65 см, крупным породам – ошейник длиной 85 см.

После вскрытия упаковки ошейник разворачивают и одевают на животное, подгоняя по размеру так, чтобы между шеей животного и ошейником оставался промежуток в 1–1,5 см, затем закрепляют фиксатором, и излишек ленты срезают, оставляя конец длиной около 5 см.

Непрерывное ношение Беафар ошейника инсектоакарицидного для собак обеспечивает защиту животного от насекомых и иксодовых клещей не менее 6 месяцев.

В первые дни применения ошейника возможно нападение и прикрепление иксодовых клещей на животное, но через 2-3 дня паразиты самопроизвольно отпадают.

При сильной степени заражения животного насекомыми перед применением Беафар ошейника инсектоакарицидного для собак животное целесообразно вымыть инсектицидным шампунем, а подстилки обработать инсектицидным средством в соответствии с инструкциями по применению.

14. Симптомы передозировки при применении лекарственного препарата в соответствии с настоящей инструкцией не выявлены.

15. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не выявлено. Ошейник влагостоек, его эффективность не снижается при намокании, но, учитывая высокую токсичность для рыб и других гидробионтов, перед купанием собак в природном водоеме ошейник необходимо снять.

16. Не допускается применение препарата Беафар ошейник инсектоакарицидный для собак лактирующим и щенным сукам, животным моложе 6-месячного возраста.

17. Следует избегать нарушений сроков применения лекарственного препарата, поскольку это может привести к снижению эффективности обработки.

18. При применении лекарственного препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности к диазинону, у некоторых собак возможны индивидуальные реакции (избыточная саливация, слезотечение, признаки раздражения кожи), в этих случаях использование Беафар ошейника инсектоакарицидного для собак прекращают, а при необходимости животному назначают десенсибилизирующую терапию.

19. Не следует одновременно применять Беафар ошейник инсектоакарицидный для собак с другими инсектицидными средствами. Информация об особенностях взаимодействия с препаратами других фармакологических групп отсутствует.

20. Беафар ошейник инсектоакарицидный для собак не предназначен для применения продуктивным животным.

IV. Меры личной профилактики

21. При работе с Беафар ошейником инсектоакарицидным для собак необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами. Во время работы с лекарственным препаратом не разрешается курить, пить и принимать пищу.

22. Владелец животного при наличии на руках порезов и ссадин при манипуляциях с ошейником следует пользоваться резиновыми перчатками. После закрепления ошейника на животном следует тщательно вымыть руки теплой водой с мылом, вымыть и просушить перчатки.

В период применения Беафар ошейника инсектоакарицидного для собак следует избегать контакта животного с маленькими детьми, особенно с грудными младенцами, а также не разрешать детям играть с ошейником.

23. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Беафар ошейником инсектоакарицидным для собак. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Беафар ошейника инсектоакарицидного для собак, утвержденная Россельхознадзором 27.06.2012 г.

Наименования и адреса производственных площадок производителя лекарственного «Беафар Б.В.», Дростенкамп 3, 8101 ВХ Раалтэ, Нидерланды/

препарата для ветеринарного применения

«Beaphar B.V.», Drostenkamp 3,
8101 BX Raalte, The Netherlands

Наименование, адрес организации,
уполномоченной держателем или
владельцем регистрационного
удостоверения лекарственного препарата
на принятие претензий от потребителя.

«Beaphar Eastern Europe, s.r.o.»,
Revolucni 1381/III, 29001 Podebrada
Чешская Республика

Номер регистрационного удостоверения 528-3-12.16-347217B4-3-2.1 00751