СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

_____

19.02.2026

ИНСТРУКЦИЯ
по ветеринарному применению лекарственного препарата
Бимаксгард® КОМПЛЕКС для собак
(Организация-разработчик: АО «НПФ «Экопром», 140070, Московская область, г. Люберцы, р.п. Томилино, ул. Гаршина, д. 11/23, пом. 263)

Номер регистрационного удостоверения: 32-3-03.25-5274№ПВР-3-03.25/04046

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Бимаксгард® КОМПЛЕКС для собак (Bimaxguard® COMPLEX for dogs)

Международные непатентованные наименования действующих веществ: имидаклоприд, моксидектин.

2. Лекарственная форма: раствор для наружного применения.

Препарат в 1 мл содержит действующие вещества имидаклоприд - 100 мг, моксидектин - 25 мг и вспомогательные вещества: спирт бензиловый, пропилен карбонат и бутилгидрокситолуол.

3. Препарат представляет собой прозрачную жидкость от светло-желтого до желтого цвета.

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения – 2 года со дня производства.

Запрещается применение препарата по истечении срока годности.

4. Выпускают Бимаксгард® КОМПЛЕКС для собак расфасованным по 0,4; 1,0; 2,5 и 4,0 мл в полимерные пипетки, упакованные поштучно в блистеры, помещенные в картонные пачки вместе с инструкцией по применению.

5. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 2 °С до 30 °С.

6. Препарат следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Бимаксгард® КОМПЛЕКС для собак относится к фармакотерапевтической группе: противопаразитарные средства в комбинациях.

10. Входящие в состав лекарственного препарата активные компоненты обеспечивают его широкий спектр противопаразитарного действия в отношении паразитирующих у собак: демодекозных (*Demodex canis*), чесоточных (саркоптоидных – *Sarcoptes scabiei var. canis*, *Otodectes cynotis*) клещей, блох (*Ctenocephalides felis*, *Ctenocephalides canis*), вшей (*Linognathus setosus*), власоедов (*Trichodectes canis*), личиночных (L4), неполовозрелых и половозрелых фаз развития кишечных нематод (*Toxocara canis, Toxascaris leonina, Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala, Trichuris vulpis*), личиночных (L4) и неполовозрелых фаз развития легочных нематод (*Angiostrongylus vasorum, Crenosoma vulpis*), половозрелых форм нематод, поражающих носовую полость (*Eucoleus boehmi*) и глаза (*Thelazia callipaeda*), половозрелых форм подкожных нематод (*Dirofilaria repens*) и личиночных форм сердечных и подкожных нематод (L3, L4 и L1 (микрофилярии) *Dirofilaria immitis и Dirofilaria repens*).

Имидаклоприд относится к группе хлороникотиниловых инсектицидов, механизм действия которых основан на взаимодействии с ацетилхолиновыми рецепторами членистоногих и нарушении передачи нервных импульсов, что приводит к гибели насекомых.

Моксидектин – полусинтетическое соединение группы мильбемицинов (макроциклические лактоны), оказывая стимулирующее действие на выделение гамма-аминомасляной кислоты и связываясь с постсинаптическими рецепторами, вызывает нарушение мышечной иннервации, паралич и гибель эктопаразитов и нематод.

После нанесения препарата на кожу имидаклоприд, практически не всасываясь, быстро распределяется по поверхности тела и, удерживаясь на эпидермисе и шерсти, оказывает длительное контактное инсектицидное действие. Моксидектин хорошо всасывается, поступает в системный кровоток, органы и ткани, достигая максимальной концентрации в плазме крови на 4-9 день, из организма выводится в течение 30 суток, в основном в неизмененном виде с фекалиями.

Бимаксгард® КОМПЛЕКС для собак по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76). В рекомендуемых дозах препарат не оказывает местно-раздражающего, эмбриотоксического, тератогенного, мутагенного и иммунотоксического действия; хорошо переносится собаками разных пород, включая колли и родственные породы собак. Препарат токсичен для рыб и других гидробионтов.

III. Порядок применения

11. Бимаксгард® КОМПЛЕКС для собак применяют собакам для лечения и профилактики демодекоза, отодектоза, саркоптоза, энтомозов, нематодозов (токсокароз, токсаскаридоз, унцинариоз, анкилостомоз, трихоцефалез, ангиостронгилез, креносомоз, эуколеоз, телязиоз), кожной формы дирофиляриоза, профилактики сердечно-легочной формы

дирофиляриоза, а также в комплексной терапии блошиного аллергического дерматита.

12. Противопоказанием к применению Бимаксгард® КОМПЛЕКС для собак является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата. Бимаксгард® КОМПЛЕКС для собак запрещается применять щенкам моложе 7-недельного возраста, больным инфекционными болезнями и выздоравливающим собакам, а также животным других видов. Обработку собак массой менее 1 кг при необходимости следует проводить с осторожностью под наблюдением ветеринарного врача.

13. При работе с Бимаксгард® КОМПЛЕКС для собак следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами.

Во время работы с лекарственным препаратом Бимаксгард® КОМПЛЕКС для собак не разрешается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. Не следует гладить и подпускать животное к маленьким детям в течение 24 часов после обработки препаратом.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Бимаксгард® КОМПЛЕКС для собак. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

14. Обработку беременных и кормящих животных при необходимости следует проводить с осторожностью под наблюдением ветеринарного врача. Щенкам до 7-недельного возраста препарат не применяют.

15. Препарат применяют путём капельного (spot-on) нанесения на сухую неповреждённую кожу. Перед использованием у пипетки отламывают или отрезают ножницами верхнюю часть и раздвинув шерсть, наносят животному в места, недоступные для слизывания, непосредственно на кожу между лопатками у основания шеи. При обработке крупных животных содержимое пипеток наносят на кожу в 3-4 места. Минимальная терапевтическая доза препарата для собак составляет 0,1 мл/кг массы животного (10 мг/кг имидаклоприда и 2,5 мг/кг моксидектина).

В зависимости от массы животного используют пипетки с препаратом различной фасовки в дозах, указанных в таблице:

Масса животного	Доза препарата (номинальный объем пипетки), мл	Доза действующих веществ, мг/кг массы животного	
		имидаклоприд	моксидектин
до 4 кг	0,4	10	2,5
от 4 до 10 кг	1,0	10-25	2,5-6,25
от 10 до 25 кг	2,5	10-25	2,5-6,25

от 25 до 40 кг	4,0	10-16	2,5-4,0

При обработке собак массой более 40 кг препарат применяют из расчета 0,1 мл на каждый килограмм массы животного, используя комбинацию пипеток различной фасовки.

Для уничтожения блох, вшей и власоедов обработку животных проводят однократно, для предотвращения повторной инвазии - один раз в четыре недели на протяжении всего сезона наибольшей активности насекомых.

В комплексной программе профилактики и лечения аллергического дерматита, вызываемого блохами, Бимаксгард® КОМПЛЕКС для собак применяют один раз в месяц.

Для лечения отодектоза (ушной чесотки) препарат применяют накожно однократно. В процессе лечения рекомендуется очищать слуховой проход от экссудата и струпьев, а в случае осложнения отитом назначать противомикробные и противовоспалительные средства. При необходимости курс лечения повторяют через 1 месяц.

С лечебной целью при саркоптозе препарат применяют один раз в месяц на протяжении двух месяцев, при демодекозе - один раз в месяц на протяжении 2-4 месяцев, в целях профилактики возможной инвазии обработки проводят 1 раз в месяц. При лечении осложненного демодекоза кратность применения препарата Бимаксгард® КОМПЛЕКС для собак увеличивают до 1 раза в неделю. Лечение рекомендуется проводить комплексно с применением этиотропных, патогенетических и симптоматических лекарственных средств.

Для дегельминтизации животных при нематодозах препарат применяют с лечебной целью однократно, с профилактической - один раз в месяц.

Для лечения эуколеоза препарат применяют один раз в месяц на протяжении 2 месяцев.

С целью профилактики сердечно-лёгочной и кожной формы дирофиляриоза в неблагополучных по заболеванию регионах препарат применяют в весенне- летне-осенний период: ежемесячно, начиная за 1 месяц до начала лета комаров (переносчиков возбудителя *D. immitis* и *D. repens)* и заканчивая через 1 месяц после завершения лета комаров.

При обнаружении в крови животного микрофилярий (стадия L1) *D. immitis* препарат Бимаксгард® КОМПЛЕКС для собак следует применять раз в месяц в течение двух последовательных месяцев.

Для лечения кожной формы дирофиляриоза (взрослые стадии *D. repens)* препарат Бимаксгард® КОМПЛЕКС для собак следует применять раз в месяц в течение шести последовательных месяцев, а для снижения количества микрофилярий (стадия L1) *D. repens* препарат Бимаксгард® КОМПЛЕКС для собак следует применять раз в месяц в течение четырех последовательных месяцев.

Препарат остаётся эффективным, даже если шерсть животного намокнет, тем не менее не следует после обработки часто мыть животное с шампунем и/или сразу после нанесения препарата купать в водоемах, так как это может снизить его эффективность.

16. При применении лекарственного препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается. В редких случаях возможны индивидуальные реакции кожи (покраснение, зуд), которые самопроизвольно проходят и не требуют применения лекарственных средств. В случае проявления аллергических реакций у чувствительного к компонентам препарата животного препарат следует тщательно смыть водой с мылом и ополоснуть шерсть большим количеством проточной воды, а при необходимости назначить антигистаминные и симптоматические средства.

17. При передозировке препарата у животного может наблюдаться: угнетённое состояние, расширение зрачков, повышенное слюноотделение, мышечная дрожь. В этом случае препарат смывают водой с моющим средством и применяют общие меры, направленные на его выведение из организма.

18. Не следует применять Бимаксгард® КОМПЛЕКС для собак совместно с другими противопаразитарными препаратами в связи с возможным взаимным усилением токсичности.

19. Особенностей действия препарата при его первом применении и отмене не установлено.

20. При обработке животных следует придерживаться рекомендуемых инструкцией интервалов. В случае пропуска очередной обработки применение препарата следует возобновить в той же дозе по той же схеме.

21. Препарат не предназначен для применения продуктивным животным.

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения	АО «Научно-производственная фирма «Экопром»; Московская обл., г.о. Люберцы, пгт. Томилино, ул. Гаршина, д. 11/23.
Наименование и адрес организации, уполномоченной владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя	АО «Научно-производственная фирма «Экопром»; Московская обл., г.о. Люберцы, пгт. Томилино, ул. Гаршина, д. 11/23, пом. 263.

Генеральный директор
АО «НПФ» Экопром» В.В. Тарабрин