



10. Препарат активен в отношении всех фаз развития вшей, блох, власоедов (*Ctenocephalides felis*, *Ctenocephalides canis*, *Linognathus setosus*, *Trichodectes canis*, иксодовых (*Ixodes*, *Dermacentor*, *Rhipicephalus*, *Haemaphysalis*, *Amblyomma*) и саркоптоидных (*Sarcoptes canis*) клещей, паразитирующих на собаках и кошках. Механизм действия фипронила, входящего в состав препарата, заключается в блокировании ГАМК-зависимых рецепторов членистоногих, нарушении передачи нервных импульсов, что приводит к параличу и гибели эктопаразитов. После нанесения препарата на кожу фипронил в течение 24 часов постепенно распределяется по всей поверхности тела и, практически не всасываясь в системный кровоток, накапливается в эпидермисе, волосяных луковицах и сальных железах, обеспечивает длительное инсектоакарицидное действие и защиту животного от эктопаразитов. Продолжительность защитного действия составляет: после обработки кошек против насекомых – 4-6 недель, против иксодовых клещей – 3-4 недели; после обработки собак против насекомых – 8-10 недель, против иксодовых клещей – 5-6 недель.

Фипроклир Спот-Он по степени воздействия на организм относится к веществам «умеренно опасным» (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывает кожно-раздражающего и резорбтивно-токсического действия, при попадании в глаза вызывает слабое раздражение. Препарат токсичен для кроликов, пчел, а также рыб и других гидробионтов.

### III. Порядок применения

11. Фипроклир Спот-Он применяют собакам и кошкам с 8-недельного возраста с лечебной и профилактической целью при энтомозах, вызываемых блохами, вшами, власоедами и акарозах, вызываемых иксодовыми клещами.


12. Противопоказанием к применению является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата (в том числе в анамнезе).

Запрещается применение Фипроклир Спот-Он больным инфекционными болезнями, выздоравливающим и ослабленным животным, щенкам и котятм моложе 8-недельного возраста, собакам массой менее 2 кг.

13. Фипроклир Спот-Он применяют животным наружно путем однократного топикального (точечного) нанесения на сухую неповрежденную кожу, используя пипетки различной фасовки в зависимости от вида и массы животного.

У пипетки, извлеченной из саше, откручивают кончик, раздвигают шерсть животного в области спины (между лопатками) и, нажимая на пипетку, наносят препарат на кожу в одну или несколько точек (см. Рис. 1).

Рис.1 Для вскрытия саше не используйте ножницы либо:





С учетом массы обрабатываемого животного выбирают пипетку необходимого объема в соответствии с таблицей:

Вид животного, масса (кг)	Объем пипетки (мл)/ содержание фипронила (мг)	Количество пипеток, штук
Кошки	0,5 /50	1
Собаки		
от 2 до 10	0,67 / 67	1
от 10 до 20	1,34 /134	1
от 20 до 40	2,68 /268	1
от 40 до 60	4,02 /402	1
более 60	2,68/ 268	2

Повторные обработки животных в сезон наибольшей активности паразитов проводят по показаниям, но не чаще одного раза в три недели.

Акарицидное действие фипронила начинается спустя 24 часа после нанесения препарата, в связи с этим обработки следует проводить не позднее, чем за сутки до предполагаемого выгула животного в местах возможного обитания клещей (парки, скверы, лес).

В целях предотвращения повторного заражения животных блохами подстилки заменяют или обрабатывают инсектицидным средством в соответствии с инструкцией по его применению.

Не следует мыть и купать животное в природных водоемах в течение 48 часов после обработки, а также наносить препарат на влажную или поврежденную кожу.

14. При передозировке препарата у животного может наблюдаться избыточное слюноотделение, мышечная дрожь, рвота. В этом случае препарат смывают водой с моющим средством и применяют общие меры, направленные на его выведение из организма.

15. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не установлено.

16. Беременным и лактирующим самкам при необходимости Фипроклир Спот-Он применяют после консультации с ветеринарным врачом.

17. Следует избегать нарушений схемы применения препарата, так как это может привести к снижению его эффективности. В случае пропуска очередной обработки ее следует провести как можно скорее в той же дозе.

18. При применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений у животных, как правило, не наблюдается. В некоторых случаях в месте нанесения препарата возможны локальные самопроизвольно проходящие изменения кожного покрова (изменение цвета, алопеция, зуд, эритема), при слизывании препарата – усиленное слюнотечение, кратковременное угнетенное состояние. При индивидуальной повышенной чувствительности и появлении аллергических реакций, препарат следует смыть водой с моющим средством и при необходимости провести десенсибилизирующую терапию.

19. Фипроклир Спот-Он не следует применять одновременно с другими инсектоакарицидными средствами, сведения о несовместимости препарата с

лекарственными препаратами других фармакологических групп и кормовыми добавками отсутствуют.

20. Фипроклир Спот-Он не предназначен для обработки продуктивных животных.

#### IV. Меры личной профилактики

21. При проведении лечебно-профилактических мероприятий с использованием Фипроклир Спот-Он рекомендуется использовать резиновые перчатки. Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы следует тщательно вымыть руки теплой водой с мылом.

22. Не следует допускать к работе с препаратом лиц с признаками аллергических, респираторных и кожных заболеваний. В течение 24 часов после обработки животное не следует гладить и подпускать к маленьким детям. Запрещается использование пустых пипеток из-под лекарственного препарата для бытовых целей; их помещают в целлофановый пакет и утилизируют с бытовыми отходами.

23. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Фипроклир Спот-Он. При случайном попадании лекарственного препарата на кожу или слизистые оболочки глаз его следует тотчас удалить тампоном и затем смыть большим количеством воды. В случае проявления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению или этикетку).

Наименование и адрес  
производственной площадки  
производителя лекарственного  
препарата для ветеринарного  
применения

«Norbrook Laboratories Limited»;  
Station Works, Camlough Road Newry,  
Co. Down, BT35 6JP, Northern Ireland,  
United Kingdom/ «Норбрук  
Лабораториес Лимитед»; Стейшен  
Уоркс, Ньюри, Кемлоу роуд, Графство  
Даун BT35 6JP, Северная Ирландия,  
Великобритания.

Наименование, адрес организации,  
уполномоченной держателем или  
владельцем регистрационного  
удостоверения лекарственного  
препарата на принятие претензий от  
потребителя.

ООО «АВК»; 111399, Москва,  
Федеративный проспект, 9, кор.2

С утверждением настоящей инструкции, утрачивает силу инструкция по применению Фипроклир Спот-Он, утвержденная Россельхознадзором 11.12.2014.

Номер регистрационного удостоверения :

826-3-10.14-24.12 ЛПКМ-3-10.14





УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель Руководителя  
Россельхознадзора

Е.А. НЕПОКЛОНОВ

11 ДЕК 2014

**ИНСТРУКЦИЯ**  
по применению Фипроклир Спот-Он для лечения  
и профилактики арахно-энтомозов у собак и кошек

(организация-разработчик: «Norbrook Laboratories Limited»,  
Великобритания)

**I. Общие сведения**

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Фипроклир Спот-Он (FiprocLEAR Spot-On).

Международное непатентованное наименование: фипронил.

2. Лекарственная форма: раствор для наружного применения.

Фипроклир Спот-Он в 1 мл в качестве действующего вещества содержит фипронил – 100 мг и вспомогательные вещества: бутиловый спирт – 100 мг, полисорбат 80 – 50 мг, повидон К12 – 50 мг, бутилгидроксианизол – 0,2 мг, бутилгидрокситолуен – 0,1 мг и диэтиленовый гликоль моноэтилового эфира – до 1 мл. По внешнему виду препарат представляет собой прозрачную бесцветную или бледно-желтого цвета жидкость.

3. Выпускают Фипроклир Спот-Он расфасованным по 0,5 мл (для кошек), 0,67 мл, 1,34 мл, 2,68 мл и 4,02 мл (для собак) в полимерные пипетки, индивидуально упакованные в саше из алюминиевой фольги, с защитой от вскрытия детьми. Пипетки помещены по 1, 2, 3, 12, 30 или 60 штук в картонные пачки в комплекте с инструкцией по применению.

4. Хранят Фипроклир Спот-Он в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 0 °С до 25 °С.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 3 года с даты производства.

Запрещается использовать Фипроклир Спот-Он по истечении срока годности.

5. Фипроклир Спот-Он следует хранить в местах, недоступных для детей.

6. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

**II. Фармакологические свойства**

7. Фипроклир Спот-Он относится к инсектоакарицидным лекарственным препаратам контактного действия группы фенилпиразолов.



Препарат активен в отношении всех фаз развития вшей, блох, власоедов (*Ctenocephalides felis*, *Ctenocephalides canis*, *Linognathus setosus*, *Trichodectes canis*, иксодовых (*Ixodes*, *Dermacentor*, *Rhipicephalus*, *Haemaphysalis*, *Amblyomma*) и саркоптоидных (*Sarcoptes canis*) клещей, паразитирующих на собаках и кошках. Механизм действия фипронила, входящего в состав препарата, заключается в блокировании ГАМК-зависимых рецепторов членистоногих, нарушении передачи нервных импульсов, что приводит к параличу и гибели эктопаразитов. После нанесения препарата на кожу фипронил в течение 24 часов постепенно распределяется по всей поверхности тела и, практически не всасываясь в системный кровоток, накапливается в эпидермисе, волосяных луковицах и сальных железах, обеспечивает длительное инсектоакарицидное действие и защиту животного от эктопаразитов. Продолжительность защитного действия составляет: после обработки кошек против насекомых – 4-6 недель, против иксодовых клещей – 3-4 недели; после обработки собак против насекомых – 8-10 недель, против иксодовых клещей – 5-6 недель.

Фипрокликр Спот-Он по степени воздействия на организм относится к веществам «умеренно опасным» (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывает кожно-раздражающего и резорбтивно-токсического действия, при попадании в глаза вызывает слабое раздражение. Препарат токсичен для кроликов, пчел, а также рыб и других гидробионтов.

### III. Порядок применения

8. Фипрокликр Спот-Он применяют собакам и кошкам с 8-недельного возраста с лечебной и профилактической целью при энтомозах, вызываемых блохами, вшами, власоедами и акарозах, вызываемых иксодовыми клещами.

9. Противопоказанием к применению является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата (в том числе в анамнезе).

Запрещается применение Фипрокликр Спот-Он больным инфекционными болезнями, выздоравливающим и ослабленным животным, щенкам и котятм моложе 8-недельного возраста, собакам массой менее 2 кг.

10. Фипрокликр Спот-Он применяют животным наружно путем однократного топикального (точечного) нанесения на сухую неповрежденную кожу, используя пипетки различной фасовки в зависимости от вида и массы животного.

У пипетки, извлеченной из саше, откручивают кончик, раздвигают у животного шерсть в области спины (между лопатками) и, нажимая на пипетку, наносят препарат на кожу в одну или несколько точек (см. Рис. 1).

Рис.1 Для вскрытия саше используйте ножницы либо:





С учетом массы обрабатываемого животного выбирают пипетку необходимого объема в соответствии с таблицей:

Вид животного, масса (кг)	Объем пипетки (мл)/ содержание фипронила (мг)	Количество пипеток, штук
Кошки	0,5 /50	1
Собаки		
от 2 до 10	0,67 / 67	1
от 10 до 20	1,34 /134	1
от 20 до 40	2,68 /268	1
от 40 до 60	4,02 /402	1
более 60	2,68 /268	2

Повторные обработки животных в сезон наибольшей активности паразитов проводят по показаниям, но не чаще одного раза в три недели.

Акарицидное действие фипронила начинается спустя 24 часа после нанесения препарата, в связи с этим обработки следует проводить не позднее, чем за сутки до предполагаемого выгула животного в местах возможного обитания клещей (парки, скверы, лес).

В целях предотвращения повторного заражения животных блохами подстилки заменяют или обрабатывают инсектицидным средством в соответствии с инструкцией по его применению.

Не следует мыть и купать животное в природных водоемах в течение 48 часов после обработки, а также наносить препарат на влажную или поврежденную кожу.

11. При передозировке препарата у животного может наблюдаться избыточное слюноотделение, мышечная дрожь, рвота. В этом случае препарат смывают водой с моющим средством и применяют общие меры, направленные на его выведение из организма.

12. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не установлено.

13. Следует избегать нарушений схемы применения препарата, так как это может привести к снижению его эффективности. В случае пропуска очередной обработки ее следует провести как можно скорее в той же дозе.

14. При применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений у животных, как правило, не наблюдается. В некоторых случаях в месте нанесения препарата возможны локальные самопроизвольно проходящие изменения кожного покрова (изменение цвета, алопеция, зуд, эритема), при слизывании препарата – усиленное слюнотечение, кратковременное угнетенное состояние. При индивидуальной повышенной чувствительности и появлении аллергических реакций, препарат следует смыть водой с моющим средством и при необходимости провести десенсибилизирующую терапию.

15. Фипроклир Спот-Он не следует применять одновременно с другими инсектоакарицидными средствами, сведения о несовместимости препарата с

лекарственными препаратами других фармакологических групп и кормовыми добавками отсутствуют.

16. Фипроклир Спот-Он не предназначен для обработки продуктивных животных.

#### IV. Меры личной профилактики

17. При проведении лечебно-профилактических мероприятий с использованием Фипроклира Спот-Он рекомендуется использовать резиновые перчатки. Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы следует тщательно вымыть руки теплой водой с мылом.

18. Не следует допускать к работе с препаратом лиц с признаками аллергических, респираторных и кожных заболеваний. В течение 24 часов после обработки животное не следует гладить и подпускать к маленьким детям.

Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Фипроклиром Спот-Он. При случайном попадании лекарственного препарата на кожу или слизистые оболочки глаз его следует тотчас удалить тампоном и затем смыть большим количеством воды. В случае проявления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению или этикетку).

19. Запрещается использование пустых пипеток из-под лекарственного препарата для бытовых целей; их помещают в целлофановый пакет и утилизируют с бытовыми отходами.

20. Организация-производитель: «Norbrook Laboratories Limited», Великобритания.

Адрес места производства: Station Works, Camlough Road, Newry, Co Down, BT35 6JP, Northern Ireland, United Kingdom.

Инструкция разработана ООО «Глобал-Вет» (111396, Москва, ул. Фрязевская, д. 10, стр. 1) совместно с «Norbrook Laboratories Limited» (Station Works, Camlough Road, Newry, Co Down, BT35 6JP, Northern Ireland, United Kingdom).

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

Номер регистрационного удостоверения

