

ИНСТРУКЦИЯ
по применению Кортаванса
для симптоматического лечения дерматозов у собак, сопровождающихся зудом

(организация-разработчик: «VIRBAC S.A.», 06516 Carros,
1^{ère} avenue 2065 m. L.I.D., France)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Кортаванс (Cortavance).
Международное непатентованное наименование: гидрокортизона ацепонат.
2. Лекарственная форма: раствор для наружного применения.
Кортаванс в 1 мл в качестве действующего вещества содержит гидрокортизона ацепонат – 0,584 мг, в качестве вспомогательного вещества метиловый эфир полипропиленгликоля.
3. По внешнему виду Кортаванс представляет собой прозрачный раствор от бесцветного до светло-желтого цвета.
Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя – 2 года с даты производства. Срок годности после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.
Запрещается использовать Кортаванс по истечении срока годности.
4. Кортаванс выпускают расфасованным по 76 мл во флаконы из полиэтилентерефталата, закрытые пластиковой навинчиваемой крышкой. Флаконы поштучно помещают картонные коробки, снабжают пульверизатором и инструкцией по применению лекарственного препарата.
5. Кортаванс хранят в закрытой упаковке производителя, отдельно от пищевых продуктов и кормов, в сухом, защищенном от света месте при температуре от 5 до 25°C.
6. Кортаванс следует хранить в местах, недоступных для детей.
7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.
8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Кортаванс относится к гормональным препаратам группы глюкокортикостероидов.
10. Гидрокортизон – гормон, секретируемый корой надпочечников. Гидрокортизон оказывает противовоспалительное, противоаллергическое, иммунодепрессивное, антиэкссудативное, противозудное действие; тормозит реакции гиперчувствительности, пролиферативные и экссудативные процессы в

соединительной ткани и в очаге воспаления; уменьшает местную гиперемию и гипертермию кожи.

Механизм действия гидрокортизона заключается в подавлении активности различных разрушающих ткани ферментов – протеаз и нуклеаз, матриксных металлопротеиназ, гиалуронидазы, фосфолипазы, торможении синтеза простагландинов, кининов, лейкотриенов и других медиаторов воспаления из арахидоновой кислоты. Он также уменьшает проницаемость тканевых барьеров и стенок сосудов, тормозит экссудацию в очаг воспаления жидкости и белка, миграцию лейкоцитов в очаг воспаления (хемотаксис) и пролиферацию соединительной ткани, стабилизирует клеточные мембраны, предотвращает перекисное окисление липидов и образование в очаге воспаления свободных радикалов.

При наружном применении гидрокортизон практически не всасывается в системный кровоток и накапливается в эпидермисе, оказывая преимущественно местное действие. Абсорбированная часть метаболизируется в эпидермисе и затем в печени. Выводится из организма преимущественно в форме неактивных метаболитов с мочой и желчью.

Кортаванс по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

III. Порядок применения

11. Кортаванс назначают для симптоматического лечения дерматозов у собак, сопровождающихся зудом.

12. Противопоказанием к применению Кортаванса является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата. Запрещается применять лекарственный препарат животным с язвенными поражениями и ранами на коже, при дерматитах бактериальной, грибковой и вирусной этиологии.

13. Кортаванс наносят на кожу один раз в сутки при помощи пульверизатора с расстояния 10 см от обрабатываемой поверхности. Доза гидрокортизона ацепоната составляет 1,52 мкг/см² пораженного участка; необходимая доза обеспечивается двукратным нажатием клапана пульверизатора на флаконе для обработки поверхности площадью 10x10 см.

Курс лечения препаратом может составлять не более 7 дней.

14. Симптомы передозировки при применении препарата Кортаванс в соответствии с инструкцией не выявлены.

15. Особенности действия при первом применении препарата и при его отмене не установлены.

16. Лекарственный препарат не предназначен для применения животным в период беременности и лактации. В случае необходимости возможно применение препарата щенкам по назначению и под контролем ветеринарного врача.

17. Следует избегать пропуска очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. При пропуске одной или нескольких доз лекарственного препарата курс применения необходимо возобновить в предусмотренных дозировках и схеме применения.

18. При применении препарата Кортаванс в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений у животных, как правило, не наблюдается. В очень редких случаях могут возникать обратимые местные реакции

в месте нанесения (эритема). В случае появления аллергических реакций использование препарата прекращают и при необходимости назначают антигистаминные средства.

19. Применение Кортаванса не исключает использование лекарственных средств других фармакологических групп, за исключением препаратов для наружного применения.

20. Кортаванс не предназначен для применения продуктивным животным.

IV. Меры личной профилактики

21. При работе с препаратом Кортаванс следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

22. Во время работы с лекарственным препаратом запрещается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы следует тщательно вымыть с мылом лицо и руки.

Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом Кортаванс.

Пустые флаконы из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

23. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками, их необходимо немедленно промыть большим количеством проточной воды. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании лекарственного препарата в организм человека необходимо немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению или этикетку).

Наименование производственной производителя препарата для применения.	и адрес площадки лекарственного ветеринарного	«ВИРБАК С.А.» 06516 Каррос, 1-я авеню 2065 М. Л.И.Д., Франция/ «VIRBAC S.A.», 06516 Carros, 1 ^{ere} avenue 2065 m. L.I.D., France.
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Наименование, уполномоченной владелец удостоверения препарата на потребителя.	адрес организации, держателем или регистратора лекарственного претензий от	Представительство общества с наблюдательным (Франция), 127018, Сушецкий Вал, д. 5, строение 2.
----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С утверждением настоящей инструкции, утрачивает силу инструкция по применению Кортаванса, утвержденная Россельхознадзором 06 августа 2014 года.

Номер регистрационного удостоверения 250-3-5.14-3227-17ВУ.3-5.14/04322