

**ИНСТРУКЦИЯ**  
по применению вакцины «Фелоцел CVR» с растворителем  
для профилактики  
вирусного ринотрахеита, калицивирусной инфекции и панлейкопении кошек  
(организация-производитель «Pfizer Animal Health» / «Пфайзер Энимал Хелз», США)

**I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

1. Вакцина «Фелоцел CVR» (Felocell CVR) предназначена для профилактической иммунизации кошек против вирусного ринотрахеита, калицивирусной инфекции и панлейкопении кошек

2. Вакцина «Фелоцел CVR» состоит из двух отдельно расфасованных компонентов: лиофилизированного препарата, содержащего живые аттенуированные штаммы вируса инфекционного ринотрахеита, калицивируса и вируса панлейкопении кошек и жидкого - растворителя для вакцины.

3. Лيوфилизированный компонент по внешнему виду представляет собой однородную пористую массу белого цвета, жидкий (растворитель) – бесцветную прозрачную жидкость.

4. Вакцина и растворитель расфасованы в пластиковые флаконы по 1,0 см<sup>3</sup> укупоренные резиновыми пробками и укрепленные алюминиевыми колпачками. Флаконы упакованы в коробки из прозрачного пластика. В каждой коробке содержится 25 флаконов с вакциной и 25 флаконов с растворителем.

5. Каждый флакон маркируют этикеткой, на которой указывают на русском языке название, назначение препарата (растворителя), организацию-производителя, дату изготовления, срок годности, информацию о подтверждении соответствия, номер государственной регистрации, номер серии, количество доз во флаконе с вакциной, условия хранения, надпись «Для животных».

На коробке указывают на русском языке: наименование и адрес организации-производителя, товарный знак, количество флаконов и доз, объем вакцины во флаконе, назначение и состав вакцины, способ введения, условия хранения, номер серии, дата изготовления и срок годности, информацию о подтверждении соответствия, номер государственной регистрации, надпись «Для животных» и вкладывают инструкцию по применению на русском языке.

6. Вакцину хранят и транспортируют в заводской упаковке в сухом, защищенном от света месте, при температуре от 2 °С до 7 °С. Не допускают замораживания. Срок годности вакцины составляет 18 месяцев со дня изготовления при указанных условиях хранения. Вакцину нельзя применять после истечения срока годности.

Флаконы с вакциной без этикеток, с нарушением укупорки, с истекшим сроком годности, с изменённым цветом, консистенцией, содержащие посторонние примеси, а также неиспользованные в течение 30 минут после вскрытия, обеззараживают кипячением в течение 15 минут. Утилизация флаконов с растворителем не требует специальных мер безопасности.

**II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА**

7. Вакцина «Фелоцел CVR» индуцирует иммунитет у кошек против вирусного ринотрахеита, калицивирусной инфекции и панлейкопении кошек, через 21 день после завершения вакцинации, сохраняющийся не менее 12 месяцев.

8. Вакцина безвредна, лечебными свойствами не обладает

**III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА**

9. Вакцина «Фелоцел CVR» предназначена для профилактической иммунизации кошек против вирусного ринотрахеита, калицивирусной инфекции и панлейкопении. Вакцинируют только здоровых животных.

10. Перед иммунизацией во флакон с вакциной с помощью стерильного шприца вносят содержимое 1 флакона растворителя и тщательно встряхивают.

11. Вакцину вводят животным в объеме 1,0 см<sup>3</sup> (1 иммунизирующая доза) подкожно или внутримышечно с соблюдением правил асептики.

12. Котят вакцинируют с 8-ми недельного возраста с интервалом 3 или 4 недели: при вакцинации котят с интервалом 3 недели, вакцинируют трехкратно в 8, 11 и 14 недель, а при вакцинации с интервалом 4 недели – вакцинируют двукратно в 8 и 12 недель. Последующие ревакцинации животных проводят ежегодно одной дозой вакцины «Фелоцел CVR» - 1,0 см<sup>3</sup>.

13. Для введения вакцины используют стерильные шприцы и иглы. Поверхность кожи в месте инъекции обрабатывают 70° спиртом.

14. Так же как и при применении других вакцин, после введения вакцины «Фелоцел CVR» возможно развитие аллергической реакции. В этом случае животным проводят соответствующую симптоматическую терапию. Иммунный ответ может быть снижен у животных перенесших воздействие стресса (транспортировка, перегруппировка и т.д.), животных, находящихся в неблагоприятных экологических условиях, при неправильном кормлении, а также при нарушении инструкции по применению вакцины.

15. Всех восприимчивых животных, которые находятся в одном помещении, желательно вакцинировать одновременно. Использование гипериммунных сывороток или иммунодепрессантов запрещается в течение 2 недель до и после вакцинации.

#### IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

16. При проведении вакцинации ветеринарным специалистам необходимо соблюдать общие правила асептики, личной гигиены и техники безопасности, принятые при работе с лекарственными средствами для животных.

17. При попадании вакцины на кожные покровы и слизистые оболочки необходимо промыть их большим количеством воды. После работы тщательно вымыть руки.

18. Вакцину следует хранить в местах, не доступных для детей.

Инструкция разработана компанией «Пфайзер» (США).

Организация-производитель Pfizer Animal health, 601 W. Cornhusker Highway, Lincoln, NE 68521, USA

Рекомендован к регистрации ФГУ «ВГНКИ».

Регистрационный номер ПВИ-1-2.8/02393

Представительство в Москве: 109147, Москва, ул. Таганская 21.

Менеджер по регистрации ветпрепаратов Представительства компании «Пфайзер»  
М.В.Сорокин

Признать утратившей силу инструкцию на вакцину Фелоцел CVR, утвержденную  
27 апреля 2008