

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Руководителя  
Россельхознадзора

Н.А. ВЛАСОВ

08.11.2018

## ИНСТРУКЦИЯ

### по ветеринарному применению лекарственного препарата Флорикол®

(Организация-разработчик: ООО «ВИК – здоровье животных»,  
Россия, 140050, Московская область, г.о. Люберцы,  
дачный поселок Красково, Егорьевское шоссе, д. 3А, офис 34)

Номер регистрационного удостоверения:

#### I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения: Флорикол® (Floricol).

Международное непатентованное наименование: флорфеникол.

2. Лекарственная форма: раствор для орального применения.

Флорикол® содержит в 1 мл в качестве действующего вещества флорфеникол – 100 мг, а в качестве вспомогательных веществ – поливинилпирролидон и полиэтиленгликоль-300.

3. Флорикол® по внешнему виду представляет собой прозрачную жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета.

Срок годности Флорикола® в закрытой упаковке производителя при соблюдении условий хранения – 2 года со дня производства.

Запрещается использовать Флорикол® по истечении срока годности.

4. Флорикол® выпускают расфасованным по 1 л в стеклянные или полимерные бутыли и по 5 л в полимерные канистры соответствующей вместимости, укупоренные навинчивающимися крышками с контролем первого вскрытия. Каждая потребительская упаковка препарата сопровождается инструкцией по применению.

5. Флорикол® хранят в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 0 °C до 25 °C.

6. Флорикол® следует хранить в недоступном для детей месте.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

## II. Фармакологические свойства

### 9. Фармакотерапевтическая группа: амфениколы.

10. Флорфеникол - синтетический антибиотик, производное тиамфеникола, в молекуле которого гидроксильная группа замещена атомом фтора. Проявляет бактериостатическое действие в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов: *Escherichia coli*, *Salmonella* spp., *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., *Pasteurella multocida*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Ornitobacterium rhinotracheale*, *Haemophilus* spp., *Proteus* spp., *Enterobacter* spp., *Shigella* spp., *Klebsiella* spp., *Bordetella* spp., а также в отношении *Mycoplasma* spp. Антибиотик активен в отношении бактерий, которые вырабатывают ацетилтрансферазу и являются устойчивыми к хлорамфениколу.

Флорфеникол связывается с 50S рибосомальной субъединицей в протоплазме бактериальной клетки, где блокирует действие фермента пептидилтрансферазы, что приводит к подавлению синтеза протеинов чувствительных бактерий.

После орального применения препарата флорфеникол быстро всасывается из желудочно-кишечного тракта и проникает в большинство органов и тканей организма животных. Максимальная концентрация антибиотика в крови достигается через 40-60 минут и сохраняется на терапевтическом уровне в течение 24 часов. Биодоступность флорфеникола составляет у свиней 88%, а у птиц – 55%.

Выделение флорфеникола и его метаболитов, основным из которых является флорфеникол амин, из организма животных и птиц происходит преимущественно с желчью и фекалиями.

Флорикол<sup>®</sup> по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

## III. Порядок применения

11. Флорикол<sup>®</sup> применяют сельскохозяйственной птице и свиньям с лечебной и лечебно-профилактической целью при колибактериозе, сальмонеллезе, пастереллезе, стафилококкозе, атрофическом рините и плевропневмонии свиней, а также при других заболеваниях бактериальной этиологии, возбудители которых чувствительны к флорфениколу.

12. Противопоказанием к применению Флорикола<sup>®</sup> является индивидуальная повышенная чувствительность животного к флорфениколу. Запрещается применение препарата курам-несушкам, яйца которых используют в пищевых целях, и ремонтному молодняку кур менее чем за 2 недели до начала яйцекладки, в связи с возможным накоплением препарата в яйцах, а также племенным хрякам.

13. При работе с Флориколом<sup>®</sup> следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

При работе с препаратом запрещается пить, курить и принимать пищу. После работы с лекарственным препаратом вымыть руки с мылом. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Флориколом®.

Пустую тару из-под Флорикола® запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

При случайном попадании лекарственного препарата на кожу его необходимо немедленно смыть водой с мылом, при попадании в глаза – промыть их в течение нескольких минут большим количеством проточной воды. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании лекарственного препарата в организм человека необходимо немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению или этикетку).

14. Не следует применять Флорикол® свиноматкам в период супоросности и вскармливания приплода, а также поросятам массой менее 2 кг.

15. Флорикол® применяют свиньям и птице индивидуально или групповым способом с водой для поения.

Птице Флорикол® выпаивают в течение 3-5 дней в суточной дозе 20 мг флорфеникола на 1 кг массы, что соответствует:

- цыплятам в возрасте до 4-х недель – 100 мл препарата на 100 л воды;
- птице старше 4-х недель – 200 мл препарата на 100 л воды.

Свиньям Флорикол® применяют в течение 7 дней в суточной дозе 5 мг флорфеникола на 1 кг массы животного (что соответствует 5 мл препарата на 100 кг массы животного).

В период лечения свиньи и птица должны получать только воду, содержащую Флорикол®. Раствор препарата готовят ежедневно из расчета потребности животных и птиц в воде в течение суток.

Возможно выпаивание суточной дозы препарата методом пульсдозинга в течение 4-6 часов.

16. Побочных явлений и осложнений при применении Флорикола® в соответствии с инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к флорфениколу и возникновении аллергических реакций использование Флорикола® прекращают и назначают антигистаминные препараты. У свиней очень редко возможны аллергические реакции в виде покраснения перианальной области и мягкий кал, которые быстро проходят после прекращения введения препарата.

17. При передозировке лекарственного препарата может наблюдаться угнетенное состояние, снижение аппетита, у поросят – покраснение, отек перианальной области и мягкий кал. Указанные симптомы кратковременны, самопроизвольно проходят и не требуют применения лекарственных средств.

18. Не рекомендуется одновременное применение Флорикола® с другими антибиотиками, непрямыми антикоагулянтами, барбитуратами, миорелаксантами.

19. Особеностей действия при первом применении и при отмене лекарственного препарата не выявлено.

20. Следует избегать пропусков при введении очередной дозы лекарственного препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае пропуска одной дозы применение препарата возобновляют в той же дозе и по той же схеме.

21. Убой свиней и птицы на мясо разрешается не ранее, чем через 6 суток после последнего применения Флорикола®. Мясо животных и птиц, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано для кормления пушных зверей.

Наименования и адреса производственных площадок производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения

1. Иностранные унитарное предприятие «ВИК – здоровье животных», Беларусь, 210040, г. Витебск, ул. 1-я Журжевская, д. 29 (полный производственный цикл)

2. ООО «ВИК – здоровье животных», Россия, 308519, Белгородская обл., Белгородский р-н, пгт Северный, ул. Березовая, зд. 1/16, корп. 15 (полный производственный цикл)

3. ООО «НПФ ВИК», Россия, 308519, Белгородская обл., Белгородский р-н, пгт Северный, ул. Березовая, зд. 1/16 (полный производственный цикл)

Наименование и адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя

ООО «ВИК – здоровье животных», Россия, 140050, Московская область, г.о. Люберцы, дачный поселок Красково, Егорьевское шоссе, д. 3А, офис 34

С согласованием настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Флорикола®, согласованная Россельхознадзором 06 июня 2017 года.