СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

19. 02. 2026

ИНСТРУКЦИЯ
по ветеринарному применению лекарственного препарата
Бимаксгард® КОМПЛЕКС для кошек
(Организация-разработчик: АО «НПФ «Экопром»; 140070, Московская обл., г. Люберцы, р.п. Томилино, ул. Гаршина, д. 11/23, пом. 263)

Номер регистрационного удостоверения:32-3-02.25-5268№ПВР-3-02.25/04042

I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:

торговое наименование: Бимаксгард® КОМПЛЕКС для кошек (Bimaxguard® COMPLEX for cats);

международные непатентованные наименования действующих веществ: имидаклоприд, моксидектин.

2. Лекарственная форма: раствор для наружного применения.

Бимаксгард® КОМПЛЕКС для кошек в 1 мл содержит действующие вещества: имидаклоприд – 100 мг, моксидектин – 10 мг и вспомогательные вещества: спирт бензиловый, пропиленкарбонат и бутилгидрокситолуол.

3. По внешнему виду препарат представляет собой прозрачную жидкость от светло-желтого до желтого цвета с характерным слабым запахом.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения - 2 года с даты производства. Не применять по истечении срока годности.

4. Выпускают препарат в форме раствора (spot-on) расфасованным по 0,4 и 0,8 мл в полимерные пипетки, упакованные поштучно в блистеры, помещенные в картонные пачки вместе с инструкцией по применению.

5. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 2 °С до 30 °С.

6. Препарат следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Лекарственный препарат Бимаксгард® КОМПЛЕКС для кошек относится к фармакотерапевтической группе: противопаразитарные средства в комбинациях.

10. Входящие в состав препарата активные компоненты обеспечивают его широкий спектр противопаразитарного действия в отношении паразитирующих у кошек чесоточных клещей (*Otodectes cynotis, Notoedres cati*), блох (*Ctenocephalides felis*), личиночных (стадия L4), неполовозрелых и половозрелых фаз развития кишечных нематод (*Toxocara cati, Ancylostoma* spp.), половозрелых фаз развития легочных нематод (*Capillaria aerophila*) и личиночных форм сердечных нематод (*Dirofilaria immitis*).

При применении препарата Бимаксгард® КОМПЛЕКС для кошек хорькам активные компоненты обеспечивают спектр действия для лечения и профилактики заражения блохами (*Ctenocephalides felis*) и профилактики дирофиляриоза (личинки *Dirofilaria immitis*).

Имидаклоприд относится к группе хлороникотиниловых инсектицидов, механизм действия которых основан на взаимодействии с ацетилхолиновыми рецепторами членистоногих и нарушении передачи нервных импульсов, что приводит к гибели насекомых.

Моксидектин – полусинтетическое соединение группы милбемицинов (макроциклические лактоны), оказывая стимулирующее действие на выделение гамма-аминомасляной кислоты и связываясь с постсинаптическими рецепторами, вызывает нарушение мышечной иннервации, паралич и гибель эктопаразитов и нематод.

После нанесения препарата на кожу имидаклоприд практически не всасываясь, быстро распределяется по поверхности тела и, удерживаясь на эпидермисе и шерсти, оказывает длительное контактное инсектицидное действие. Моксидектин хорошо всасывается, поступает в системный кровоток, органы и ткани, достигая максимальной концентрации в плазме крови на 1-2 день, из организма выводится в течение 30 суток, в основном в неизмененном виде с фекалиями.

Бимаксгард® КОМПЛЕКС для кошек по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76). В рекомендуемых дозах препарат не оказывает местно-раздражающего, эмбриотоксического, тератогенного, мутагенного и иммунотоксического действия; хорошо переносится кошками разных пород. Препарат токсичен для рыб и других гидробионтов.

III. Порядок применения

11. Бимаксгард® КОМПЛЕКС для кошек назначают кошкам для лечения и профилактики отодектоза, нотоэдроза, энтомозов, кишечных нематодозов (токсокароза, анкилостомоза), легочных нематодозов (легочного капилляриоза), для профилактики сердечно-легочной формы дирофиляриоза, а также в комплексной терапии блошиного аллергического дерматита.

Бимаксгард® КОМПЛЕКС для кошек назначают хорькам для лечения и профилактики заражения блохами и профилактики дирофиляриоза.

12. Противопоказанием к применению является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата.

Бимаксгард® КОМПЛЕКС для кошек запрещено применять больным инфекционными болезнями и выздоравливающим кошкам. Обработку кошек весом менее 1 кг и хорьков менее 0,8 кг, при необходимости, следует проводить с осторожностью под наблюдением ветеринарного врача.

13. Во время работы с лекарственным препаратом Бимаксгард® КОМПЛЕКС для кошек не разрешается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы руки следует тщательно вымыть теплой водой с мылом.

При работе с препаратом Бимаксгард® КОМПЛЕКС для кошек следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Не следует гладить и подпускать животное к маленьким детям в течение 24 часов после обработки.

Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом Бимаксгард® КОМПЛЕКС капли для кошек. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека, следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

14. Запрещается применение препарата котятам моложе 9-недельного возраста, обработку беременных и кормящих животных, при необходимости, следует проводить с осторожностью под наблюдением ветеринарного врача.

15. Препарат применяют путем капельного (spot-on) нанесения на сухую неповрежденную кожу. Перед использованием у пипетки отламывают или отрезают ножницами верхнюю часть и, раздвинув шерсть, наносят препарат животному в места, недоступные для слизывания, непосредственно на кожу между лопатками у основания шеи. Минимальная терапевтическая доза препарата для кошек составляет 0,1 мл/кг массы животного (10 мг/кг имидаклоприда и 1,0 мг/кг моксидектина).

В зависимости от веса животного используют пипетки с препаратом различной фасовки в дозах, указанных в таблице:

Вид животного	Доза препарата (номинальный объем пипетки), мл	Доза действующих веществ, мг/кг массы животного	
		имидаклоприд	моксидектин
Кошки до 4 кг и хорьки	0,4	10	1,0
Кошки более 4 кг	0,8	10-20	1,0-2,0

При обработке кошек более 8 кг препарат применяют из расчета 0,1 мл на каждый килограмм веса животного, используя комбинации пипеток различной фасовки.

Для уничтожения блох обработку животных проводят однократно, у кошек один раз в четыре недели, у хорьков — один раз в три недели.

В комплексной программе профилактики и лечения аллергического дерматита, вызываемого блохами, Бимаксгард® КОМПЛЕКС для кошек применяют один раз в месяц.

Для лечения нотоэдроза, легочного капилляриоза препарат применяют накожно однократно. Для лечения отодектоза (ушной чесотки) препарат применяют накожно однократно. Не следует вводить препарат непосредственно в ушной канал. В процессе лечения рекомендуется очищать слуховой проход от экссудата и струпьев, а в случае осложнения отитом, назначать противомикробные и противовоспалительные средства. При необходимости курс лечения повторяют через 1 месяц.

Для дегельминтизации животных препарат применяют однократно.

С целью профилактики дирофиляриоза в неблагополучных по заболеванию регионах препарат применяют в весенне-летне-осенний период: перед началом лета комаров (переносчиков возбудителя *D. immitis*) однократно, затем один раз в месяц и последний раз в сезоне не ранее, чем через 1 месяц после завершения лета насекомых.

В случае проживания или кратковременного пребывания животного в неблагополучных по заболеванию регионах, перед назначением препарата с целью профилактики дирофиляриоза рекомендуется провести диагностику животного на инвазирование половозрелыми дирофиляриями. В случае обнаружения половозрелых стадий лечение препаратом Бимаксгард® КОМПЛЕКС для кошек не проводится.

Препарат остается эффективным, даже если шерсть животного намокнет, тем не менее, не следует после обработки часто мыть животное с шампунем и/или сразу после нанесения препарата купать в водоемах, так как это может снизить его эффективность.

При совместном содержании животных, рекомендуется разделить их после обработки до полного высыхания места нанесения препарата.

16. Побочных явлений и осложнений при применении лекарственного препарата в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. В редких случаях у животного возможно появление следующих симптомов: покраснение кожи, зуд, эритема, рвота, которые самопроизвольно проходят и не требуют применения лекарственных средств.

В редких случаях возможны местные аллергические реакции. В случае проявления аллергических реакций у чувствительного к компонентам препарата животного, препарат следует тщательно смыть водой с мылом и ополоснуть шерсть большим количеством проточной воды, а при необходимости назначить антигистаминные и симптоматические средства.

При случайном слизывании препарата в очень редких случаях возможно появление неврологических реакций, слюноотделения (обусловленного горьким вкусом препарата), как правило, кратковременны и самопроизвольно проходящие.

В очень редких случаях применение препарата может вызвать дискомфорт у животного, который может проявляться кратковременной апатией, волнением и отсутствием аппетита.

17. При передозировке препарата в редких случаях (менее одного животного на 10 000 обработанных) могут наблюдаться угнетенное состояние, расширение зрачков, повышенное слюноотделение, мышечная дрожь. В этом случае препарат смывают водой с моющим средством и применяют общие меры, направленные на его выведение из организма.

18. Не следует применять лекарственный препарат Бимаксгард® КОМПЛЕКС для кошек одновременно с другими противопаразитарными средствами, а также с препаратами, содержащими макроциклические лактоны.

19. Особенностей действия при первом применении лекарственного препарата и отмене не установлено.

20. При обработке животных следует придерживаться рекомендуемых инструкцией интервалов. В случае пропуска очередной обработки, применение препарата следует возобновить в той же дозе, по той же схеме.

21. Препарат не предназначен для применения продуктивным животным.

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения	АО «Научно-производственная фирма «Экопром»; Московская обл., г.о. Люберцы, пгт. Томилино, ул. Гаршина, д. 11/23.
Наименование и адрес организации, уполномоченной владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя	АО «Научно-производственная фирма «Экопром»; Московская обл., г.о. Люберцы, пгт. Томилино, ул. Гаршина, д. 11/23, пом. 263.

Генеральный директор
АО «НПФ «Экопром» В.В. Тарабрин